

Vaccin conjugué contre le pneumocoque

La vaccination,
la meilleure protection



La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves à pneumocoque et leurs complications. La bactériémie (infection du sang) avec ou sans pneumonie et la méningite (infection des enveloppes du cerveau) sont 2 infections graves causées par le pneumocoque. Il existe plusieurs types de pneumocoque. Le vaccin conjugué protège contre les 10 types (vaccin Synflorix) ou les 13 types (vaccin Prevnar 13) les plus fréquents.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Infections à pneumocoque	<ul style="list-style-type: none"> • Otite • Sinusite • Pneumonie • Méningite (infection des enveloppes du cerveau) • Bactériémie (infection du sang) 	<ul style="list-style-type: none"> • Surdit� (devenir sourd) • Dommages permanents au cerveau • D�c�s

Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves   pneumocoque et leurs complications. Le vaccin conjugu  contre le pneumocoque est indiqu  pour tous les enfants  g s de 2 mois   4 ans. Il est aussi recommand  aux personnes  g es de 5   17 ans qui ont une condition m dicale qui augmente leur risque d'infection grave   pneumocoque. Les adultes dont la rate est absente ou d ficiante (par chirurgie ou   la suite de certaines maladies) ou dont le syst me immunitaire est affaibli devraient aussi recevoir ce vaccin. Le nombre de doses   recevoir varie selon l' ge et la condition m dicale de la personne.

Les sympt mes apr s la vaccination

Des sympt mes peuvent  tre caus s par le vaccin (ex. : rougeur   l'endroit o  l'injection a  t  faite).

D'autres probl mes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de t te).

Le vaccin conjugu  contre le pneumocoque est s curitaire. Dans la majorit  des cas, il ne provoque aucune r action.

Fr�quence	R�actions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Tr�s souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Douleur, rougeur, gonflement � l'endroit o� l'injection a �t� faite • Chez les enfants, fi�vre l�g�re, irritabilit�, perte d'app�tit, changements dans le sommeil • Chez les adultes, mal de t�te, douleur musculaire, douleur aux jointures, frissons, fatigue, rougeurs sur la peau, diarrh�e, vomissements 	<ul style="list-style-type: none"> • Appliquer une compresse humide froide � l'endroit o� l'injection a �t� faite. • Utiliser un m�dicament contre la fi�vre ou les malaises au besoin. • Consulter un m�decin selon la gravit� des sympt�mes.
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Chez les enfants, fi�vre �lev�e, vomissements, diarrh�e, rougeurs sur la peau • Chez les adultes, fi�vre l�g�re 	
Parfois (moins de 1 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> • Chez les enfants, rougeur, gonflement, de plus de 7 cm � l'endroit o� l'injection a �t� faite • Chez les jeunes enfants, convulsions dues � la fi�vre, pleurs inhabituels ou persistants • Chez les adultes, enflure des ganglions, r�action allergique 	
Rarement (moins de 1 personne sur 1 000)	<ul style="list-style-type: none"> • Chez les enfants, �pisodes semblables � une perte de conscience (p�leur, faiblesse, absence de r�action), r�action allergique 	

Il est recommand  de demeurer sur place au moins 15 minutes apr s une vaccination, car les r actions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une r action allergique survient, les sympt mes appara tront quelques minutes apr s la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette r action imm diatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous   la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Sant  8-1-1 ou votre m decin.

