

# Vaccin injectable contre la typhoïde

La vaccination,  
la meilleure protection



La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la typhoïde et ses complications. Ce vaccin est indiqué pour les voyageurs qui se rendent dans des régions où ils risquent d'attraper la typhoïde à cause de la présence de la maladie et de mauvaises conditions sanitaires.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Typhoïde</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>La typhoïde se transmet par un contact avec de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne infectée par la typhoïde.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Fièvre</li> <li>Mal de tête</li> <li>Maux de ventre</li> <li>Constipation</li> <li>Pouls lent</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Décès (1 % des cas même avec un traitement)</li> </ul>

## Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la typhoïde et ses complications.

En plus de la vaccination, il est important d'éviter la consommation d'eau et d'aliments susceptibles d'être contaminés ainsi que d'appliquer des mesures d'hygiène simples (lavage des mains et désinfection des objets souillés par des selles).

## Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin injectable contre la typhoïde est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Fréquence	Réactions connues causées par ce vaccin	Ce qu'il faut faire
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> <li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li> </ul>
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**