

Test cutané à la tuberculine (TCT)

La vaccination,
la meilleure protection



Ce test est utilisé pour évaluer si une personne a été infectée par le microbe qui cause la tuberculose. La maladie survient des mois ou des années après l'infection par le microbe. La maladie peut se développer dans différents organes, par exemple les poumons, les os, les reins. Seule la tuberculose laryngée ou pulmonaire est contagieuse.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
Tuberculose	<ul style="list-style-type: none"> La tuberculose se transmet par l'inhalation de très petites gouttelettes produites par la toux ou l'éternuement d'une personne atteinte de tuberculose contagieuse. 	<ul style="list-style-type: none"> Toux Crachats Fatigue Fièvre Perte de poids Sueurs 	<ul style="list-style-type: none"> Pleurésie (infection des enveloppes des poumons) Méningite (infection des enveloppes du cerveau)

Le TCT

Le TCT est utilisé pour savoir si une personne a déjà été infectée par le microbe qui cause la tuberculose ou pour obtenir une valeur de base chez les personnes qui pourraient être en contact dans le futur avec ce microbe (ex. : travailleurs de la santé).

Les symptômes après le TCT

Des symptômes peuvent être causés par le TCT (ex. : rougeur à l'endroit où le TCT a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le TCT (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Ce test est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Fréquence	Réactions possibles au TCT	Ce qu'il faut faire
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> Démangeaisons, inconfort à l'endroit où le TCT a été fait 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où le TCT a été fait. Ne pas laver, ni gratter, ni essuyer vigoureusement l'endroit où le TCT a été fait. Ne pas appliquer un diachylon ou de l'onguent à l'endroit où le TCT a été fait.
Parfois (moins de 1 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> Rougeurs sur la peau à l'endroit où le TCT a été fait dans les 12 heures qui suivent le TCT 	<ul style="list-style-type: none"> Ne pas appliquer un diachylon ou de l'onguent à l'endroit où le TCT a été fait.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après un TCT, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique grave survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après le TCT. La personne qui fait le TCT sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui fait le TCT, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.