

# Calendrier régulier de vaccination

Certains vaccins sont recommandés pour tous. Ils font partie du calendrier de vaccination.

| Vaccin qui protège contre :                       | À 2 mois | À 4 mois | À 6 mois                 | À 12 mois | À 18 mois | Entre 4 et 6 ans                            | 4 <sup>e</sup> année du primaire                                     | 3 <sup>e</sup> année du secondaire | Après 60 ans          |
|---|----------|----------|--------------------------|-----------|-----------|---|--|------------------------------------|-----------------------|
| Diphtérie-coqueluche-tétanos-hépatite B-polio-Hib | ✓        | ✓        | ✓<br>(sans l'hépatite B) |           | ✓         |   |  |                                    |                       |
| Pneumocoque                                       | ✓        | ✓        |                          | ✓         |           |   |  |                                    | ✓<br>(65 ans et plus) |
| Rotavirus   | ✓        | ✓        |                          |           |           |   |  |                                    |                       |
| Grippe (automne-hiver)                            |          |          | ✓*                       |           |           |   |  |                                    | ✓                     |
| Méningocoque C                                    |          |          |                          | ✓         |           |   |  | ✓                                  |                       |
| Rougeole-rubéole-oreillons                        |          |          |                          | ✓         | ✓         |   |  |                                    |                       |
| Varicelle   |          |          |                          |           | ✓         | ✓<br>(depuis le 1 <sup>er</sup> avril 2016) |  |                                    |                       |
| Diphtérie-coqueluche-tétanos-polio**              |          |          |                          |           |           | ✓   |  | ✓<br>(sans la polio)               |                       |
| Hépatite B  |          |          |                          |           |           |   | ✓<br>(le vaccin utilisé protège aussi contre l'hépatite A)           |                                    |                       |
| Virus du papillome humain                         |          |          |                          |           |           |   | ✓<br>(ajout des garçons à compter du 1 <sup>er</sup> septembre 2016) |                                    |                       |

\* Dès l'âge de 6 mois ou dès que le vaccin est disponible (automne-hiver), puis chaque année jusqu'à l'âge de 2 ans.

\*\* Une dose du vaccin dcaT est aussi indiquée pour tous les adultes.

[santé.gouv.qc.ca/vaccination](http://santé.gouv.qc.ca/vaccination)