

# FICHE INDICATIVE

Concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque

| Septembre 2018 |

| POPULATIONS / CONDITIONS   | GRIPPE <sup>1-2</sup><br>INDIQUÉ ET GRATUIT | PNEUMOCOQUE<br>INDIQUÉ ET GRATUIT |                    |                  |
|--|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
|  |   | PNEU-C <sup>3-4</sup><br>< 18 ANS | PNEU-C<br>≥ 18 ANS | PNEU-P           |
| <b>Femmes enceintes, en bonne santé au 2<sup>e</sup> ou au 3<sup>e</sup> trimestre de la grossesse (13 semaines et plus)</b>   | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
| Personnes âgées de <b>6 mois à 74 ans, incluant les femmes enceintes (quel que soit le stade de la grossesse)</b> , présentant l'une des conditions énumérées ci-dessous :                                     |   |                                   |                    |                  |
| <b>Asplénie</b> anatomique ou fonctionnelle  | Oui   | Oui                               | Oui <sup>6</sup>   | Oui <sup>7</sup> |
| Conditions amenant une <b>immunodépression</b> (ex. : déficit immunitaire, leucémie, traitement immunodépresseur, greffe d'organe ou de moelle osseuse, cancer, infection par le VIH)                          | Oui   | Oui                               | Oui <sup>6</sup>   | Oui <sup>7</sup> |
| <b>Insuffisance rénale chronique</b> ou <b>syndrome néphrotique</b>  | Oui   | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui <sup>7</sup> |
| <b>Maladie cardiaque</b> ou <b>pulmonaire chronique</b> assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers  | Oui   | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Asthme</b> assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, chez les personnes âgées de 50 ans et plus  | Oui   | Non <sup>5</sup>                  | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Asthme</b> assez grave pour nécessiter un suivi médical régulier ou des soins hospitaliers, chez les personnes âgées de moins de 50 ans   | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
| Conditions entraînant une <b>diminution de l'évacuation des sécrétions respiratoires ou des risques d'aspiration</b> (ex. : trouble cognitif, lésion médullaire, trouble convulsif, troubles neuromusculaires) | Oui   | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Diabète</b>   | Oui   | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Maladie hépatique chronique</b>   | Oui   | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Écoulement chronique de liquide céphalorachidien</b>  | Non <sup>5</sup>                            | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Itinérance et/ou utilisation actuelle et régulière de drogues dures</b> (par inhalation ou injection) avec une <b>détérioration de l'état de santé</b> ou des <b>conditions de vie précaires</b>            | Non <sup>5</sup>                            | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| Présence d'un <b>implant cochléaire</b>  | Non <sup>5</sup>                            | Oui                               | Non <sup>5</sup>   | Oui              |
| <b>Anémie</b> (sauf si anémie falciforme – voir asplénie)  | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
| <b>Hémophilie</b>  | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
| <b>Erreur innée du métabolisme</b> (ex : tyrosinémie héréditaire de type I)  | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
| <b>Obésité importante</b> (IMC ≥ 40)   | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
| <b>Traitement prolongé à l'acide acétylsalicylique</b> (Pour les jeunes âgés de moins de 18 ans)   | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |

CONDITIONS MÉDICALES OU CONDITIONS DE VIE

Cette fiche mentionne les indications de vaccination gratuite, soutenue financièrement par le MSSS, pour le vaccin contre la grippe à partir de l'âge de 6 mois, le vaccin contre le pneumocoque conjugué (Pneu-C) à partir de l'âge de 2 mois et le vaccin contre le pneumocoque polysaccharidique (Pneu-P) à partir de l'âge de 2 ans. Pour plus de détails, voir la section *Calendriers de vaccination, Autres vaccins recommandés* et la section *Vaccins, Pneumocoque, Tableau synthèse des vaccins contre le pneumocoque* dans le PIQ.

SOURCE : Protocole d'immunisation du Québec (PIQ).

[msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination](http://msss.gouv.qc.ca/professionnels/vaccination)

# FICHE INDICATIVE

Concernant la vaccination gratuite contre la grippe et contre les infections invasives à pneumocoque

| POPULATIONS / CONDITIONS |  | GRIPPE <sup>1-2</sup><br>INDIQUÉ ET GRATUIT | PNEUMOCOQUE<br>INDIQUÉ ET GRATUIT |                    |                  |
|--------------------------|--|---|-----------------------------------|--------------------|------------------|
|                          |  |   | PNEU-C <sup>3-4</sup><br>< 18 ANS | PNEU-C<br>≥ 18 ANS | PNEU-P           |
| ÂGE OU MILIEU DE VIE     | Résidents des centres d'hébergement, des établissements de soins de longue durée ou des ressources intermédiaires  | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
|                          | Enfants âgés de <b>2 à 59 mois</b>   | Non <sup>5</sup>                            | Oui                               | -                  | Non <sup>5</sup> |
|                          | Personnes en bonne santé âgées de <b>65 à 74 ans</b>   | Non <sup>5</sup>                            | -                                 | Non <sup>5</sup>   | Oui <sup>7</sup> |
|                          | Personnes âgées de <b>75 ans et plus</b>   | Oui   | -                                 | Non <sup>5</sup>   | Oui <sup>7</sup> |
| CONTACTS                 | Travailleurs de la santé   | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |
|                          | Personnes qui vivent sous le même toit et aidants naturels des personnes faisant partie des groupes à risque, incluant l'entourage des enfants âgés de moins de 6 mois | Oui   | Non <sup>5</sup>                  |                    |                  |

## LÉGENDE

- Chez les enfants âgés de 2 à 17 ans, le vaccin intranasal ou le vaccin injectable peuvent être utilisés. Chez les autres groupes visés, le vaccin injectable contre la grippe est le produit recommandé.
- Chez les enfants âgés de moins de 9 ans qui n'ont jamais reçu de vaccin contre la grippe, administrer 2 doses à 4 semaines d'intervalle. Toutefois, la 2<sup>e</sup> dose n'est pas requise si un enfant a reçu au moins 1 dose d'un vaccin trivalent ou quadrivalent dans le passé.
- Le vaccin Pneu-C fait partie du calendrier régulier de vaccination chez les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. Le nombre de doses à administrer varie en fonction de l'âge de début de la vaccination et des conditions de santé de l'enfant.
- Les personnes âgées de 5 ans ou plus à risque accru d'infection invasive à pneumocoque qui n'ont pas reçu la primovaccination avec le vaccin Pneu-C-10 ou le vaccin Pneu-C-13 doivent recevoir 1 dose de Pneu-C-13. Le vaccin conjugué doit être administré en premier, au moins 8 semaines avant le vaccin Pneu-P. Sinon, attendre 1 an avant d'administrer le vaccin conjugué.
- À moins de présenter une des autres conditions mentionnées dans cette fiche pour lesquelles le vaccin gratuit est indiqué.
- Les adultes présentant une asplénie anatomique ou fonctionnelle ou un état d'immunodépression qui n'ont jamais reçu le vaccin Pneu-C-13 doivent recevoir 1 dose de ce vaccin. Le vaccin conjugué doit être administré en premier, au moins 8 semaines avant le vaccin Pneu-P. Sinon, attendre 1 an avant d'administrer le vaccin conjugué.
- Chez les personnes présentant une asplénie, un état d'immunodépression, une insuffisance rénale chronique ou un syndrome néphrotique, revacciner avec 1 seule dose de Pneu-P, 5 ans après la 1<sup>re</sup> dose de Pneu-P.  
Les personnes ayant reçu le vaccin Pneu-P avant l'âge de 65 ans (peu importe le nombre de doses reçues) doivent recevoir 1 dose de Pneu-P à partir de l'âge de 65 ans, au moins 5 ans après la dernière dose.  
L'utilité de toute dose subséquente reste à préciser.