

# Vaccin contre le rotavirus

| Mars 2017 |

La vaccination,  
la meilleure protection

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre les gastroentérites causées par le rotavirus et leurs complications. Avant la vaccination, plus de 95 % des enfants souffraient d'une gastroentérite à rotavirus avant l'âge de 5 ans.



| Maladie          | Signes et symptômes  | Complications possibles   |
|------------------|--|---|
| <b>Rotavirus</b> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diarrhée</li><li>• Vomissements</li><li>• Fièvre</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Déshydratation</li><li>• Hospitalisation pour soigner la déshydratation (au Québec, avant la vaccination, on comptait de 900 à 1 500 hospitalisations par année à cause du rotavirus)</li></ul> |

## IMPORTANT

**C'est à vous de prendre rendez-vous** au CLSC ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant.

Prochain rendez-vous  
pour la vaccination :

# Renseignements sur le vaccin contre le rotavirus

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les gastroentérites causées par le rotavirus et leurs complications. Selon le vaccin utilisé, 2 ou 3 doses sont nécessaires. La 1<sup>re</sup> dose doit être administrée avant l'âge de 20 semaines et la dernière dose doit l'être avant l'âge de 8 mois.

Comme le virus contenu dans le vaccin peut se retrouver dans les selles pendant une dizaine de jours après la vaccination, il est important de bien se laver les mains lors du changement de couches.

**Des symptômes peuvent être causés par le vaccin. D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).**

**Le vaccin contre le rotavirus est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.**

| Fréquence                                    | Réactions connues causées par ce vaccin   | Ce qu'il faut faire  |
|--|---|--|
| Souvent<br>(moins de 10% des enfants)        | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diarrhée ou vomissements</li></ul>  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li></ul> |
| Très rarement<br>(1 à 7 enfants sur 100 000) | <ul style="list-style-type: none"><li>• Il est possible que le vaccin amène, dans la semaine qui suit la vaccination, une invagination intestinale, c'est-à-dire une forme d'obstruction de l'intestin qui se traite à l'hôpital.</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>               |

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

## POUR TOUTE QUESTION,

adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.

Vous pouvez également consulter le site [sante.gouv.qc.ca/vaccination](http://sante.gouv.qc.ca/vaccination)