Vaccin conjugué contre le pneumocoque

| Octobre 2023 |

La vaccination,
la meilleure protection

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre les infections graves à pneumocoque et leurs complications. La bactériémie (infection du sang) avec ou sans pneumonie et la méningite (infections des enveloppes du cerveau) sont 2 infections graves causées par le pneumocoque. Il existe plusieurs types de pneumocoque. Les vaccins conjugués protègent contre les types les plus fréquents.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Infections à pneumocoque	• Otite • Sinusite • Pneumonie • Méningite (infection des enveloppes du cerveau) • Bactériémie (infection du sang)	• Surdité (devenir sourd) • Dommages permanents au cerveau • Décès

IMPORTANT

C'est à vous de prendre rendez-vous au CLSC ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant.

Prochain rendez-vous pour la vaccination :

23-278-22FA © Gouvernement du Québec, 2023

Votre gouvernement

Québec

Renseignements sur le vaccin conjugué contre le pneumocoque

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections graves à pneumocoque et leurs complications. Le vaccin conjugué contre le pneumocoque est indiqué pour tous les enfants âgés de 2 mois à 4 ans. Le calendrier de vaccination prévoit l'administration d'une dose du vaccin à l'âge de 2, 4 et 12 mois. Ce vaccin est aussi recommandé aux personnes qui ont une condition médicale qui augmente leur risque d'infection grave à pneumocoque. Le nombre de doses et le type de vaccin à recevoir varient selon l'âge et la condition médicale de la personne.

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin conjugué contre le pneumocoque est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Très souvent (moins de 50 % des enfants)	• Douleur, rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite • Fièvre légère, irritabilité, perte d'appétit, changements dans le sommeil	• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite. • Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin. • Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.
Souvent (moins de 10 % des enfants)	• Fièvre élevée, vomissements, diarrhée, rougeurs sur la peau	
Parfois (moins de 1 % des enfants)	• Rougeur, gonflement de plus de 7 cm à l'endroit où l'injection a été faite • Convulsions dues à la fièvre, pleurs inhabituels ou persistants	
Rarement (moins de 1 enfant sur 1 000)	• Épisodes semblables à une perte de conscience (pâleur, faiblesse, absence de réaction), réaction allergique	

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

POUR TOUTE QUESTION,
adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, consultez Info-Santé 811 ou votre médecin.

Vous pouvez également consulter le site
Québec.ca/vaccination

Santé et Services sociaux Québec