

# Vaccin conjugué contre le méningocoque de séro groupe C

La vaccination,  
la meilleure protection



La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de séro groupe C et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves causées par le méningocoque de séro groupe C. Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque entre autres les sérogroupes A, B, C, Y et W135. Ce vaccin protège contre le séro groupe C.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Méningocoque de séro groupe C</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Forte fièvre</li> <li>• Mal de tête important</li> <li>• Nausées et vomissements</li> <li>• Atteinte de l'état général</li> <li>• Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dommages permanents au cerveau</li> <li>• Amputation des mains ou des pieds (10 à 15 % des cas)</li> <li>• Décès (10 à 15 % des cas)</li> </ul>

## Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de séro groupe C et leurs complications. Au Québec, ce vaccin est recommandé aux enfants à l'âge de 1 an et en 3<sup>e</sup> année du secondaire.

## Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin conjugué contre le méningocoque de séro groupe C est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> </ul>
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rougeur et gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>• Fièvre, somnolence (envie de dormir) et irritabilité, surtout chez les enfants âgés de moins de 5 ans</li> <li>• Mal de tête, malaise, douleur musculaire et douleur aux jointures, surtout chez les personnes âgées de 11 ans et plus</li> <li>• Perte d'appétit, nausées, vomissements, diarrhée</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li> <li>• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**