

Immunoglobulines (Ig) contre la rougeole

L'immunisation,
une bonne protection



Les Ig contre la rougeole sont des anticorps obtenus à partir du sang de plusieurs donneurs. Elles protègent contre la rougeole et ses complications. La rougeole est une maladie causée par un virus. Il existe aussi un vaccin contre la rougeole. Les Ig protègent pendant quelques mois alors que le vaccin protège pour de nombreuses années.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
Rougeole	<ul style="list-style-type: none"> La rougeole se transmet par un contact avec les sécrétions du nez ou de la gorge d'une personne infectée. 	<ul style="list-style-type: none"> Rougeurs Toux Fièvre Conjonctivite (yeux rouges) Atteinte de l'état général 	<ul style="list-style-type: none"> Otite (5 à 9 % des cas) Pneumonie (1 à 5 % des cas) Convulsions Dommages permanents au cerveau (1 cas sur 1 000) Décès (1 cas sur 3 000)

Les Ig contre la rougeole

Les Ig sont un des moyens de protection contre la rougeole et ses complications. Les Ig sont recommandées à certaines personnes de l'entourage immédiat d'une personne qui a la rougeole.

Les symptômes après l'immunisation

Des symptômes peuvent être causés par les Ig (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec les Ig (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Les Ig contre la rougeole sont sécuritaires. Dans la majorité des cas, elles ne provoquent aucune réaction.

Réactions possibles aux Ig	Ce qu'il faut faire
<ul style="list-style-type: none"> Douleur, rougeur, raideur à l'endroit où l'injection a été faite Fièvre, rougeur du visage, mal de tête, frissons et nausées 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite. Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin. Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une immunisation avec des Ig, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après l'immunisation. La personne qui donne les Ig sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne les Ig, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.