

# Immunoglobulines contre l'hépatite B (HBIg)

L'immunisation,  
une bonne protection



Les HBIg sont des anticorps obtenus à partir du sang de plusieurs donneurs. Elles protègent contre l'hépatite B et ses complications. L'hépatite B est une infection du foie causée par un virus. Il existe aussi un vaccin contre l'hépatite B qui peut être donné en même temps que les HBIg. Les HBIg protègent pendant quelques mois, alors que le vaccin protège pour de nombreuses années.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Hépatite B</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'hépatite B se transmet par le contact d'une muqueuse (ex. : la bouche, les organes génitaux) ou d'une plaie avec le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fièvre</li><li>Maux de ventre</li><li>Jaunisse</li><li>Vomissements</li><li>Diarrhée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Atteinte grave du foie</li><li>Infection chronique du foie (10% des adultes et jusqu'à 90% des bébés)</li><li>Cirrhose</li><li>Cancer du foie</li><li>Décès (1% des cas)</li></ul>

## Les HBIg

Les HBIg sont un des moyens de protection contre l'hépatite B et ses complications. Les HBIg sont recommandées à certaines personnes de l'entourage d'une personne qui a l'hépatite B.

## Les symptômes après l'immunisation

Des symptômes peuvent être causés par les HBIg (ex. : douleur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec les HBIg (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Les HBIg sont sécuritaires. Dans la majorité des cas, elles ne provoquent aucune réaction.

Réactions possibles aux HBIg	Ce qu'il faut faire
<ul style="list-style-type: none"><li>Douleur et démangeaisons à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>Enflure du visage</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li><li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les maux de tête au besoin.</li><li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une immunisation avec des HBIg, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après l'immunisation. La personne qui donne les HBIg sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne les HBIg, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**