

Immunoglobulines contre la varicelle (Varlg)

L'immunisation,
une bonne protection



Les Varlg sont des anticorps obtenus à partir du sang de plusieurs donneurs. Elles protègent contre la varicelle et ses complications. La varicelle, communément appelée *picote*, est une maladie causée par un virus. Il existe aussi un vaccin contre la varicelle. Les Varlg protègent pendant quelques mois, alors que le vaccin protège pour de nombreuses années.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
Varicelle	<ul style="list-style-type: none"> La varicelle se transmet par un contact avec les sécrétions du nez ou de la gorge d'une personne infectée. 	<ul style="list-style-type: none"> Fièvre Boutons de varicelle (petites cloques qui forment une croûte et sèchent) Démangeaisons 	<ul style="list-style-type: none"> Otite Pneumonie Infection d'un bouton de varicelle (ex. : impétigo) Infection grave (ex. : bactérie mangeuse de chair) Encéphalite (infection du cerveau) Malformations chez le bébé dont la mère a fait la varicelle pendant la grossesse Zona (15 à 30 % au cours de la vie) Décès

Les Varlg

Les Varlg sont un des moyens de protection contre la varicelle et ses complications. Les Varlg sont recommandées à certaines personnes qui ont possiblement été exposées de façon significative au virus de la varicelle et qui ont un risque élevé de souffrir des complications de la maladie.

Les symptômes après l'immunisation

Des symptômes peuvent être causés par les Varlg (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec les Varlg (ex. : rhume, gastro, mal de tête). Les Varlg sont sécuritaires. Dans la majorité des cas, elles ne provoquent aucune réaction.

Fréquence	Réactions possibles aux Varlg	Ce qu'il faut faire
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> Douleur à l'endroit où l'injection a été faite 	<ul style="list-style-type: none"> Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> Rougeur à l'endroit où l'injection a été faite Mal de tête et rougeurs sur la peau Fièvre, douleur musculaire, frissons, fatigue, nausées, bouffées de chaleur 	<ul style="list-style-type: none"> Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin. Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une immunisation avec des Varlg, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après l'immunisation. La personne qui donne les Varlg sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne les Varlg, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.