

## QUELQUES PRÉCAUTIONS !!!

- Ne modifiez jamais la dose sans en avoir discuté auparavant avec votre médecin.
- Si vous avez oublié une dose, prenez-la aussitôt que possible la même journée, mais ne prenez jamais deux doses en même temps.
- Certains médicaments peuvent interférer avec l'isoniazide. Consulter votre médecin ou votre pharmacien avant de prendre tout autre médicament vendu avec ou sans ordonnance.
- Essayez de ne pas prendre d'alcool tout au long du traitement.
- Il est possible que votre médecin vous fasse prendre un supplément de vitamine B6 (pyridoxine) tout au long de votre traitement avec l'isoniazide. Cela a pour but de prévenir ou diminuer certains effets indésirables de l'isoniazide.
- Il est très important de vous présenter aux rendez-vous planifiés avec votre médecin car ils permettent d'évaluer les bienfaits de votre traitement ainsi que de prévenir les effets indésirables possibles. Il se peut que votre médecin demande des prises de sang pour vérifier la tolérance au niveau du foie.

## À PROPOS DE LA CONSERVATION...

- Gardez votre médicament hors de la portée des enfants.
- Gardez votre médicament à la température de la pièce à l'abri de la chaleur, de la lumière ainsi que de l'humidité.
- Jetez ou renouvelez votre médicament lorsque la date d'expiration est échuée.

## N'OUBLIEZ PAS :

**IL FAUT PRENDRE VOTRE MÉDICAMENT JUSQU'À LA FIN DU TRAITEMENT !!!**

[www.msss.gouv.qc.ca](http://www.msss.gouv.qc.ca)

*Vous prenez de  
l'isoniazide pour  
prévenir une  
TUBERCULOSE?*

**Vous avez  
sûrement des questions...**



*Un dépistage tuberculinique (PPD) a permis de constater que vous avez été infecté par le microbe de la tuberculose. Votre médecin vous a donc prescrit un traitement pour prévenir l'apparition de la tuberculose.*

## **VOICI QUELQUES QUESTIONS FRÉQUEMMENT POSÉES :**

### **POURQUOI DOIS-JE PRENDRE DES MÉDICAMENTS SI JE NE SUIS PAS MALADE ?**

Le microbe qui cause la tuberculose, une fois qu'il est entré dans vos poumons, peut rester endormi durant plusieurs mois à plusieurs années. Cette période se passe habituellement sans symptômes. Vous prenez des médicaments pour éviter que les microbes se réveillent et causent des symptômes qui vous rendront très malade.

### **EST-CE QUE JE PEUX TRANSMETTRE LA MALADIE ?**

Non. Même si votre test de dépistage (PPD) est positif, les examens faits par votre médecin prouvent que vous ne pouvez pas transmettre le microbe aux autres. Une personne est contagieuse seulement lorsque la radiographie des poumons montre des signes de maladie et qu'il y a présence de symptômes, comme de la toux et des crachats.



### **POURQUOI DOIS-JE PRENDRE DES MÉDICAMENTS SI LONGTEMPS ?**

Les microbes responsables de la tuberculose peuvent vivre longtemps dans le corps. Pour tuer tous les microbes de la tuberculose, la durée du traitement est de 6 à 12 mois. Il faut prendre votre traitement tel que prescrit et aussi longtemps que votre médecin le recommande.

### **Y A-T-IL DES FRAIS POUR LE TRAITEMENT ?**

Non. Le traitement préventif contre la tuberculose est gratuit. La plupart du temps, le médicament prescrit est l'isoniazide (INH).



## **QUAND ET COMMENT PRENDRE L'ISONIAZIDE ?**

- Prenez votre médicament régulièrement, à chaque jour. L'utilisation d'une dosette vous aidera. Vous pouvez aussi demander l'aide d'une personne de votre entourage pour vous faire penser à prendre votre médicament.
- Il est très important de prendre votre médicament jusqu'à la fin du traitement pour un effet préventif maximal.
- Si vous éprouvez des problèmes de digestion prenez votre médicament avec de la nourriture.
- Prenez le médicament au coucher si vous ressentez de la fatigue.

## **QUELS SONT LES EFFETS INDÉSIRABLES POSSIBLES ?**

- Votre médicament est généralement assez bien toléré. Certaines personnes peuvent se plaindre de problèmes digestifs comme un inconfort à l'estomac. Cependant, si vous avez une perte d'appétit, des nausées importantes ou des vomissements, de la faiblesse, de la fièvre, une urine foncée, des troubles de la vue, un jaunissement de la peau et des yeux, un engourdissement des pieds et des mains, cessez immédiatement votre médicament et contactez votre médecin le plus tôt possible.
- Si vous êtes diabétique, prenez note que l'isoniazide peut modifier les résultats des tests de glucose. Consultez votre médecin avant de faire des changements dans votre traitement pour le diabète.