

PORTRAIT DE SANTÉ DU QUÉBEC ET DE SES RÉGIONS

EN UN COUP D'OEIL

Québec **

Cette affiche présente une sélection d'indicateurs liés aux déterminants et à l'état de santé de la population du Québec. Les résultats sont fournis pour le Québec et pour chacune des 18 régions sociosanitaires. Ces indicateurs sont extraits du document Pour guider l'action - Portrait de santé du Québec et de ses régions : les statistiques et ils sont classés selon le modèle de ce dernier.

Par ailleurs, les fiches détaillées de ce document contiennent davantage d'informations relatives à ces indicateurs tels que les définitions, les méthodes de calcul et les sources de données. On y retrouve également plusieurs autres indicateurs pour un total de 101 fiches thématiques. D'autres éléments d'information complètent le document, notamment les éléments méthodologiques et un survol des déterminants et de l'état de santé pour chaque région.

LÉGENDE

O Situation PLUS FAVORABLE que celle du Québec Situation MOINS FAVORABLE que celle du Québec Numéro de la fiche descriptive correspondante dans

(00) le document Pour guider l'action - Portrait de santé du Québec et de ses régions : les statistiques.

ND Non disponible.

n.p. Non présenté

Valeur imprécise

NOTES

La différence avec le reste du Québec a fait l'objet d'un test statistique au seuil de 0,01.

2. S'applique à la région de l'événement. Coefficient de variation supérieur à 16,66 % et inférieur * ou égal à 33,33 %. La valeur doit être interprétée avec prudence.

** n.p. Coefficient de variation supérieur à 33,33 %. La valeur n'est pas présentée.

Pour consulter le document Pour guider l'action - Portrait de santé du Québec et de ses régions : les statistiques, vous pouvez consulter le site Internet du ministère de la Santé et des Services sociaux (www.msss.gouv.qc.ca, section Documentation, rubrique Publications).

© Gouvernement du Québec, 2011

Santé et Services sociaux Québec * *

Avec la collaboration de: Institut national de santé publique Institut de la statistique

ENUN COUP D'OEIL PORTRAIDU QUÉB SES RÉGI		ENSEMBLE DU QUÉBEC	BAS-SAINT- LAURENT	SAGUENAY— LAC-SAINT-JEAN	CAPITALE- NATIONALE	MAURICIE ET CENTRE- DU-QUÉBEC	ESTRIE	MONTRÉAL	OUTAOUAIS	ABITIBI- TÉMISCAMINGUE	CÔTE-NORD	NORD-DU-QUÉBEC	GASPÉSIE— ÎLES-DE-LA- MADELEINE	CHAUDIÈRE- APPALACHES	LAVAL	LANAUDIÈRE	LAURENTIDES	MONTÉRÉGIE	NUNAVIK	TERRES-CRIES- DE-LA-BAIE-JAMES	
CONDITIONS DÉMOGRAPHIQUES ET SOCIOÉCONOMIQUES																					
(1) Population totale (2011)	Nombre	7946832	201 326	270681	692789	497 092	310263	1925476	366747	145 039	94518	14186	94521	407773	401870	476553	560827	1 459 389	11860	15922	
0-17 ans (2011)	%	19,1	17,1	18,0	16,8	17,9	19,1	18,3	20,1	20,4	20,2	21,0	15,7	19,3	20,8	20,6	20,4	20,3	40,2	38,2	
18-64 ans (2011)	%	65,1	63,4	64,4	65,6	63,3	63,8	66,2	66,9	64,7	65,3	68,3	63,8	64,2	63,9	65,3	65,3	64,8	56,6	56,6	
65 ans et plus (2011)	<u>%</u>	15,8	19,5	17,6	17,6	18,8	17,2	15,6	12,9	15,0	14,5	10,8	20,5	16,5	15,3	14,0	14,3	14,9	3,2	5,2	_
(2) Indice synthétique de fécondité (2004-2008)	enfants/femme	1,62	1,62	1,67	1,45 🔾	1,65	1,66	1,50 🔾	1,69	1,81 🔾	1,83 🔾	1,75	1,53 🔾	1,79	1,66	1,75	1,77	1,72	3,22 0		
(3) Familles monoparentales avec enfants de moins de 18 ans (2006)	<u>%</u>	23,7	20,3 0	20,5 🔾	23,1	25,0	24,3	27,3 🔾	25,7	22,7	27,5	20,6	24,5	18,7 🔾	21,3	21,6	23,1	22,2	40,5 🔾		<u></u>
(5) Population de 25-64 ans sans diplôme d'études secondaires (2009) (6) Taux de chômage (2009)	96	16,6 8,5	9,2	15,6 10,0	10,9 🔾		17,4 7,5	12,9 11,1 O	18,5 6,3 O	9,5	ND 9,9	ND ND	31,2 O 15,6 O	5,9	11,4 O 7,6	19,5 8,2	17,6 7,8	17,3 7,6	ND ND	ND ND	_
(7) Population vivant sous le seuil de faible revenu (MFR) (2007)		12,7	10,5	10,1	9,5 🔾		12,4	20,2 🔾	11,7	11,4	12,4	ND	12,7	7,7 0	10,3	10,2	10,3	10,0	ND	ND	_
(8) Prestataires d'assistance sociale (2010)	%	7,6	7,5	7,4	5,4 🔾		8,5	11,1 0	6,5	7,5	7,9	4,3 🔾	•	4,5 🔾	4,8 🔾	5,9 🔾	5,5 🔾	5,6 🔾	7,2	3,7 🔾	5
ÉTAT DE SANTÉ GLOBALE																					
(10) Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé¹ (2007-2008)	%	9,8	11,1	11,1	7,6	10,5	11,8	10,3	11,2	13,1	9,9	7,7	14,1	8,8	10,2	10,5	7,8	9,0	ND	ND	
(11) Espérance de vie des hommes¹ (2005-2008)	ans	78,3	78,0	77,6 🔾	78,4	77,5 🔾	78,5	78,5 🔾	77,6 🔾	77,0 🔾	77,0 🔾	77,4	75,7 🔾	78,8 🔾	79,6 🔾	78,1	78,1	78,5 🔾	64,5 🔾		5
Espérance de vie des femmes¹ (2005-2008)	ans	83,1	83,2	82,4 🔾	83,6 🔾	82,8	83,7 🔾	83,4 🔾	82,0 🔾	82,3 🔾	82,0 🔾	82,3	82,2 🔾	83,9 🔾	83,7 🔾	82,4 🔾	82,0 🔾	83,1	68,1 🔾	81,3	
(12) Espérance de vie en bonne santé des hommes (2006)	ans	66,5	66,4	66,5	67,7	66,3	66,4	65,7	63,2 🔾	64,0	66,4	66,0	64,1	68,4	68,4	67,1	67,1	67,2	51,3 🔾	61,5 🔾	<u>)</u>
Espérance de vie en bonne santé des femmes (2006)	ans	68,3	69,2	69,0	70,1 🔾	68,4	68,8	67,1	65,1 🔾	66,8	68,5	67,1	67,5	70,7 🔾	69,4	68,4	68,6	68,7	54,6 🔾		<u> </u>
(16) Taux ajusté de mortalité par tumeurs malignes¹ (2005-2008)	p. 100 000	238	235	250 🔾	236	242	231	229 🔾	243	239	275 🔾	258	280 🔾	221 🔾	225 🔾	260 🔾	253 🔾	237	466 🔾		_
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil circulatoire¹ (2005-2008)	p. 100 000	192	190	183	183 🔾	192	189	198 🔾	201	205	182	183	214 🔾	181 🔾	164 🔾	181 🔾	196	201 🔾	* 269	207	_
Taux ajusté de mortalité par maladies de l'appareil respiratoire¹ (2005-2008)	p. 100 000	64	75 🔾	67	65	70 🔾	59	61 🔾	64	72	79 🔾	* 79	65	62	54 🔾	72 🔾	68	62	* 336 🔾	* 119 🔾	
SANTÉ DES MÈRES ET DES TOUT-PETITS																					
(24) Naissances dont la mère a moins de 11 années de scolarité¹ (2006-2008)	%	7,3	7,3	4,9 🔾	3,2 🔾		9,0 🔾	7,0 🔾	13,6 🔾	13,4 🔾	14,4 🔾	16,1 🔾	8,2	3,8 🔾	5,5 🔾	9,8 🔾		5,6 🔾	50,7 🔾		
(26) Naissances de faible poids¹ (moins de 2 500 g) (2004-2008)	% n 1 000 naise viventee	5,7	5,4	5,3	5,3 🔾		5,8	6,0 🔾	5,6	* 0.1	5,8	6,0	7,1 🔾	5,2 🔾	5,9	6,1	5,6	5,5	6,6	3,7 🔾	
(29) Taux de mortalité infantile¹ (2005-2008)	p. 1 000 naiss. vivantes	3,3	* 4,3	4,5	4,0	3,9	2,9	3,4	* 1,5 🔾	* 2,1	* 5,5	** n.p.	* 4,8	2,8	3,3	2,7	3,4	2,9	* 20,3 🔾	* 10,6 🔾	
HABITUDES DE VIE	24	05.0	05.4	05.0	0.1.1	05.4	00 - 0	05.0	0.5.0	00.0	00.4	400	00 - 0	05.0	22.2	00.4	0.1.1	00.0	A UD	ND	
(31) Population de 18 ans et plus sédentaire durant les loisirs¹ (2007-2008)	%	25,8	25,4	25,8	24,4	25,1	20,7 🔾		25,6	28,6	28,1	16,9 🔾	30,7 🔾	25,2	33,3 🔾		24,1	26,8	ND	ND	_
(32) Fumeurs chez les 12 ans et plus¹ (2007-2008) (34) Population de 12 ans et plus présentant une consommation abusive d'alcool¹ (2007-2008)	<u>%</u>	24,2 17,3	22,3 16,2	23,7	22,3	26,2 18,7	23,9	24,5 16,3	28,1 16,9	25,2 20,1	29,4 18,7	25,7 21,2	27,8 17,6	21,4 18,0	22,8 10,1 O	28,8 18,4	23,9 18,3	22,7 15,2	ND ND	ND ND	_
MALADIES CHRONIQUES	70	17,5	10,2	24,3	21,1	10,7	20,3	10,3	10,9	20,1	10,7	21,2	17,0	10,0	10,1	10,4	10,3	13,2	ND	ND	
	0/	11.0	15.0	10.7	10.0	11 E	0.4	11.0	11.0	11.6	11.0	7 1	146	11.0	0.5	0.0	10.7	10.7	ND	ND	
(36) Prévalence chez les 12 ans et plus de l'arthrite¹ (2007-2008) Prévalence chez les 12 ans et plus de l'asthme¹ (2007-2008)	96	11,2 8,5	15,3 8,2	12,7 9,3	12,2 7,3	11,5 7,5	9,4 6,4	11,3 8,8	11,2 8,8	11,6 8,9	11,3 10,5	7,1 11,5	14,6 8,3	11,9 7,5	9,5 7,6	9,8	10,7 9,4	10,7 9,2	ND ND	ND ND	_
(37) Taux ajusté de prévalence du diabète¹ (2006-2007)	%	6,0	4,9 🔾	5,4 🔾	5,5 🔾	5,7 🔾	5,3 🔾	6,5 🔾	n.p.	6,0	7,2 🔾	n.p.	6,7 🔾	5,5 🔾	6,2 🔾	6,2 🔾		6,0	n.p.	n.p.	_
(39) Population de 18 ans et plus présentant un surplus de poids¹ (2007-2008)	%	48,2	52,1	49,0	47,4	48,0	45,0	44,3 🔾	52,2	55,7 🔾	56,1 🔾	<u>'</u>	57,9 🔾	50,0	48,3	53,1	50,3	48,4	ND	ND	_
(41) Taux ajusté d'incidence du cancer¹ (2003-2006)	p. 100 000	511	500	552 🔾	527 🔾	504	505	493 🔾	455 🔾	480 🔾	570 🔾	542	578 🔾	510	512	541 🔾	546 🔾	514	654	391	_
Taux ajusté d'incidence du cancer du côlon, rectum et anus¹ (2003-2006)	p. 100 000	69	72	81 🔾	67	69	66	66 🔾	66	62	61	* 86	70	64	69	69	72	73 🔾	* 135	* 68	
Taux ajusté d'incidence du cancer du poumon, trachée et bronches¹ (2003-2006)	p. 100 000	90	94	101 🔾	85 🔾	91	83	80 🔾	98 🔾	100	127 🔾	* 96	119 🔾	84	88	112 🔾	107 🔾	89	* 231 🔾	** n.p.	
Taux ajusté d'incidence du cancer du sein chez la femme ¹ (2003-2006)	p. 100 000	133	149 🔾	161 🔾	148 🔾	_	128	130	116 🔾	122	124	* 154	150	132	133	136	132	130	** n.p.	* 90	_
Taux ajusté d'incidence du cancer de la prostate¹ (2003-2006)	p. 100 000	125	110 🔾	127	142 🔾	140 🔾	122	113 🔾	76 🔾	107	128	* 109	114	141 🔾	115	127	143 🔾	134 🔾	** n.p.	** n.p.	
SANTÉ BUCCODENTAIRE																					
(45) Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé buccodentaire¹ (2007-2008)	%	12,0	9,6	10,9	9,4	11,8	11,5	14,1	13,3	13,8	9,3	12,1	10,9	10,8	11,6	11,6	11,5	11,8	ND	ND	
MALADIES INFECTIEUSES																					
(48) Taux d'incidence de l'infection à Campylobacter¹ (2005-2009)	p. 100 000	30,0	35,2 🔾	29,6	42,3 🔾	48,4 🔾	40,3 🔾	23,5 🔾	17,8 🔾				23,8	39,7 🔾	20,6 🔾	30,4	24,2 🔾	31,3		** n.p.	_
(49) Taux d'incidence de l'infection invasive à pneumocoque¹ (2005-2009)	p. 100 000	10,7	8,8	14,8 🔾	11,0	13,1 🔾	17,9 🔾		7,7 🔾	10,5			7,8	11,6	8,6 🔾	9,9	9,5	8,3 🔾			
(52) Taux d'incidence de l'infection génitale à <i>Chlamydia trachomatis</i> ¹ (2005-2009)	p. 100 000	181,7	125,5 🔾	145,2 🔾	189,7 🔾	209,6 🔾	191,5 🔾	202,7 🔾	202,4 🔾	214,2 🔾	291,3 🔾	195,8	117,6 🔾	99,0 🔾	178,0	168,5 🔾	185,7	136,5 🔾	2475,4 🔾	1465,3 🔾	
ENVIRONNEMENT PHYSIQUE ET SANTÉ																					
(63) Non-fumeurs de 12 ans et plus exposés à la fumée secondaire à la maison¹ (2007-2008)	%	10,8	13,6	9,9	10,4	10,4	13,3	8,3 🔾	13,1	10,7	12,0	18,4	13,6	11,9	10,3	11,9	11,5	12,2	ND	ND	
TRAVAIL ET SANTÉ																					
(71) Population de 15-74 ans victime de blessure au travail¹ (2008)	%	3,3	* 3,6	4,5	* 3,3	3,8	* 3,6	* 2,8	* 2,5	4,3	* 3,8	4,7	* 3,5	3,7	* 1,8	* 3,5	* 3,3	* 3,9	ND	ND	
TRAUMATISMES NON INTENTIONNELS																					
(76) Population de 15 ans et plus victime de blessures¹ (2008)	%	11,0	10,1	11,6	11,7	10,8	11,6	9,6	11,2	12,4	11,2	12,6	9,8	11,1	11,0	12,3	11,8	11,8	ND	ND	_
(79) Taux ajusté de mortalité par accidents de véhicules à moteur¹ (2005-2008)	p. 100 000	8	14 🔾	13 🔾	6 🔾	12 🔾	12 🔾	4 🔾	8	15 🔾	16 🔾	** n.p.	15 🔾	12 🔾	5 🔾	11 🔾	10	8	** n.p.	** n.p.	
SANTÉ MENTALE																					
(83) Population de 12 ans et plus ne se percevant pas en bonne santé mentale¹ (2007-2008)	%		* 3,0	* 2,8	* 3,1	* 2,8	* 3,8	4,0	* 3,8	5,2	* 2,5	* 2,3	* 3,8	* 4,1	* 3,1	* 3,6	* 2,9	* 2,9	ND	ND	
Population de 15 ans et plus éprouvant un stress quotidien élevé ¹ (2007-2008)	%	26,3	21,7 🔾	19,4 🔾	27,1	25,6	24,1	26,9	25,1	27,2	21,7 🔾	24,2	19,6 🔾	24,2	27,3	27,9	30,2	26,9	ND	ND	
(87) Taux ajusté de mortalité par suicide¹ (2005-2008)	p. 100 000	15,4	22,0 🔾	17,3	17,2	20,3 🔾	17,5	11,4 🔾	16,0	22,7 🔾	19,4	** n.p.	21,9 🔾	19,0 🔾	11,2 🔾	16,2	16,0	13,7 🔾	99,6 🔾	* 15,2	
ENVIRONNEMENT SOCIAL																					
(91) Taux de décrochage au secondaire du réseau public (2008-2009)	%	21,3	13,9 🔾	13,5 🔾	15,7 🔾		24,2	24,6	26,8 🔾	16,0 🔾	19,5	15,0 🔾	15,9 🔾		21,5	23,4	21,1	19,6	80,5 🔾	91,6 🔾	<u>)</u>
(93) Taux de crimes violents² (2009)	p. 100 000	1064	835 🔾		978	1013	753 🔾		1380 🔾	1278 🔾		ND	1183	652 🔾	862 🔾	967	1108	821 🔾	ND	ND	
Taux de crimes pour violence conjugale² (2005-2009)	p. 100 000 femmes	417	333 🔾	325 🔾	353	386	303 🔾		495 🔾	491 🔾	771 🔾	ND	400	247 🔾	399	394	443	340 🔾	ND	ND " 4 4	
(94) Population de 75 ans et plus vivant seule (2006)	%	39,3	35,5	38,3	42,9 🔾	40,5	40,3	42,9 🔾	38,1	41,9	37,3	# 50,0	30,3 🔾	37,7	34,5 🔾	33,3 🔾	35,8	36,2	# 15,4	# 4,4	TC.
SERVICES DE SANTÉ																					8-0,
(98) Population de 12 ans et plus n'ayant pas de médecin régulier¹ (2007-2008)	%		17,3 🔾	13,7 🔾		· ·	25,9	36,3 🔾		32,7 🔾			21,0 🔾			25,1	25,7	25,1	ND	ND	1-22
(99) Femmes de 50 à 69 ans ayant passé une mammographie au cours d'une période de deux ans¹ (200	W %	67,3	67,7	70,7	13,1	68,8	70,5	61,6	55,4	67,4	69,6	//,1 U	01,8	72,0	69,2	o9,1 U	64,3	69,6	38,4 U	74,6	, .