


Vous trouvez une
seringue
usagée.



QUE FAIRE

**pour éviter les accidents
et la transmission possible
de graves infections ?**

QUE FAIRE

en cas de piqûre accidentelle ?

Lavez la plaie avec de l'eau et du savon.

Consultez rapidement un médecin, par exemple dans une urgence,
autant que possible dans un délai de 2 heures.

À l'accueil, précisez que vous vous êtes piqué avec une seringue usagée.



**Dites aux enfants de ne jamais toucher
à une seringue.**

**S'ils en trouvent une, ils doivent le dire
tout de suite à un adulte.**

www.msss.gouv.qc.ca



Quand vous ramassez la seringue, manipulez-la avec précaution et prenez garde car d'autres seringues peuvent se trouver à proximité.



Déposez près de la seringue un contenant en plastique ayant un couvercle (comme un pot de beurre d'arachide ou un grand contenant de pilules ou de vitamines).
Ouvrez le contenant.



Saisissez la seringue par le bout non piquant de façon à ce que l'aiguille soit éloignée de votre corps.

Même si vous trouvez le capuchon, ne tentez jamais de le replacer sur l'aiguille pour éviter de vous blesser.

Déposez la seringue dans le contenant.



Vissez le couvercle solidement.




Lavez-vous bien les mains avec du savon.



Ne jetez jamais le contenant renfermant la seringue dans un bac de recyclage ni dans une poubelle.

Apportez le contenant à un CLSC ou à une pharmacie.



Si vous n'avez pas de contenant adéquat pour y déposer la seringue trouvée et la transporter, appelez **Info Santé 8-1-1.**