

عملية اللقاح
ضد مرض
كوفيد-19



للمساعدة مع الموافقة المستتيرة

ما هي الأعراض الأكثر شيوعاً بعد اللقاح؟

ألم في
مكان الحقن؛



إرهاق، صداع، آلام عضلية أو مفاصل
وحمي



هذه أعراض خفيفة إلى معتدلة وعادة ما تختفي في غضون يوم أو يومين. يمكنك تناول أدوية الحمى أو مسكنات الألم مثل الأسيتامينوفين أو الإيبوبروفين لتخفيفها.

هل هناك أعراض أخرى نادرة؟

ردود الفعل التحسسية نادرة الحدوث. وفي حالة حدوثها، تظهر عادة في غضون دقائق بعد التطعيم عندما يكون المتلقون لا يزالون تحت المراقبة وبالتالي سيتم علاجهم على الفور.

خلال الأشهر المقبلة، سيبقى كوفيد-19 طالما أن الغالبية العظمى من السكان لم يتم تطعيمها بعد.

دعونا نواصل حماية أنفسنا!

يجهز اللقاح دفاعات الجسم ضد
فيروسات وبكتيريا معينة.

سيساعد اللقاح جهاز المناعة
لديك على مكافحة الفيروس
المسبب لكوفيد-19 بكفاءة.

لماذا يجب أن أتلقى اللقاح؟

< لأنه يحمي من كوفيد-19 ويساعدك على
تجنب الإصابة بالمرض

< حتى لو تعافى العديد من الأشخاص دون
علاج، فقد يموت البعض من كوفيد-19
أو يعانون من مشاكل في القلب أو الرئة
مثل الالتهاب الرئوي. يمكن أن يتأثر
الجهاز العصبي أيضاً



اغسل يديك



اسعل في كمك



غطي وجهك



حافظ على المسافة
الخاصة بك

Québec.ca/vaccinCOVID

☎ 1 877 644-4545