



جهت کمک به رضایت آگاهانه

علائم متداول بعد از واکسیناسیون چیست؟

درد در
محل تزریق



خستگی، سردرد، درد
عضلانی یا مفاصل و تب



این‌ها علام سبک تا متوسط هستند که معمولاً ظرف یک یا دو روز از بین می‌روند. شما می‌توانید داروی تب یا درد مثل استامینوفن یا ایبوپروفن مصرف کنید تا درد بهبود یابد.

آیا علائم نادر دیگر نیز وجود دارد؟

واکنش‌های آلرژی نادر هستند و اگر اتفاق بیفتند، معمولاً ظرف چند دقیقه بعد از واکسیناسیون یعنی زمانی اتفاق می‌افتند که دریافت‌کننده هنوز تحت پایش است و بلافاصله درمان می‌شود.

در ماه‌های آینده که هنوز تعداد زیادی از مردم واکسینه نشده‌اند، COVID-19 هنوز وجود خواهد داشت.

ببایید به محافظت از خود ادامه دهیم!



دست‌های خود را
بشوید



در آستین خود
سرفه کنید



صورت خود را
بپوشانید



فاصله خود را حفظ
کنید

واکسیناسیون بدن شما را
آماده‌ی دفاع علیه ویروس و
باکتری‌های خاص می‌کند.

واکسن به سیستم ایمنی بدن
شما کمک می‌کند با ویروس
عامل COVID-19 مبارزه
کارآمد کند.

چرا باید واکسن بزنم؟

< واکسن از شما در مقابل COVID-19 محافظت کرده و کمک می‌کند بیمار نشوید

< حتی اگر تعداد زیادی بدون درمان، بهبود یابند، بعضی ممکن است به علت COVID-19 بمیرند یا مبتلا به مشکلات قلبی و تنفسی مثل ذات‌الریه شوند. سیستم عصبی نیز ممکن است متاثر شود.

Québec.ca/vaccinCOVID

☎ 1 877 644-4545