

OUTIL NATIONAL D'ÉVALUATION DU RISQUE DE CARIE : 0-5 ANS

	OUI	NON
1 Nettoyage des dents avec une brosse à dents au moins deux fois par jour par un parent ou le responsable de l'enfant.	0	1
2 Utilisation quotidienne de dentifrice fluoré.	0	1
3 Pratiques d'alimentation (une ou plusieurs) : → Biberon ou verre à bec entre les repas contenant d'autres liquides que de l'eau (boissons gazeuses, jus de fruits, lait, lait au chocolat). → Biberon ou verre à bec au coucher ou à la sieste. → Consommation de collations ou de boissons sucrées entre les repas (p. ex.: biscuits, friandises, céréales sucrées, croustilles, boissons gazeuses, jus de fruits, lait au chocolat). → Enfant > 12 mois : absence d'une routine d'hygiène buccale après l'introduction d'aliments solides combinée à l'allaitement ou l'alimentation au biberon. → Enfant > 12 mois : alimentation au biberon.	1	0
4 Ménage à faible revenu (difficulté à joindre les deux bouts à la fin du mois).	1	0
5 Plaque dentaire ou résidus alimentaires sur les dents.	1	0
6 Signes visibles de la carie et/ou historique de carie(s) chez l'enfant.	3	0

TOTAL :

↓

<3 : RISQUE FAIBLE

≥3 : RISQUE ÉLEVÉ

Adapté pour le Québec de l'Outil national d'évaluation du risque de la carie (< 6 ans) produit par le D^r R.J. Schroth de l'Université du Manitoba, la Société canadienne de pédiatrie, l'Académie canadienne de dentisterie pédiatrique et l'Agence de la santé publique du Canada (2019).
Pour consulter l'outil original [Canadian Caries Risk Assessment Tool | Dr. Gerald Niznick College of Dentistry | University of Manitoba.](#)