



Tableau 2 – Options de traitement
Symptômes ou trouble dépressifs MOYENS OU GRAVES chez les adultes

Options de traitement pour les symptômes ou le trouble dépressifs moyens ou graves classées selon l'interprétation du comité du National Institute for Health and Care Excellence (NICE), en fonction de leur efficacité clinique et de leur rapport coût-efficacité, et en tenant compte de facteurs relatifs à leur mise en œuvre.

Traitement	Mode de prestation	Principales caractéristiques	Autres points à considérer
1. Combinaison d'une intervention utilisant des techniques cognitivo-comportementales ou TCC individuelle et d'un antidépresseur	Combine les bienfaits de rencontres régulières avec un intervenant à ceux d'un médicament.	Les rencontres avec un intervenant procurent un soutien immédiat tandis que le médicament met un certain temps à agir.	Des effets indésirables peuvent se manifester avec le médicament et certaines personnes peuvent trouver difficile d'arrêter de les prendre par la suite.
2. Intervention utilisant des techniques cognitivo-comportementales ou TCC individuelle	Traitement individuel offert par un intervenant formé dans ce traitement. Consiste généralement en 16 rencontres régulières.	Axée sur la manière dont les pensées, les croyances, les attitudes, les émotions et le comportement interagissent entre eux. Axée sur l'apprentissage de capacités d'adaptation permettant de composer différemment avec les situations de la vie. Orientée sur un objectif et structurée. Axée sur la résolution des problèmes actuels.	Peut être aidante pour les personnes capables de reconnaître les pensées négatives ou les comportements répétitifs inefficaces qu'elles souhaitent changer. Peut convenir aux personnes qui n'aiment pas parler de leurs symptômes ou de leur trouble dépressifs en groupe. Pas d'opportunité d'obtenir du soutien de la part de pairs vivant des expériences similaires. Permet d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments. Implique de faire certaines activités et exercices à la maison.
3. Activation comportementale (AC) individuelle	Traitement individuel offert par un intervenant. Consiste généralement en 12 à 16 rencontres régulières.	Axée sur l'identification des liens entre les activités d'une personne et son humeur. Aide la personne à reconnaître des schèmes (<i>patterns</i>) et à planifier des changements concrets qui réduisent l'évitement et sont axés sur les comportements qui favorisent une amélioration de l'humeur. Orientée sur un objectif et structurée. Axée sur la résolution des problèmes actuels. Ne cible pas directement les pensées et les émotions.	Peut être aidante pour les personnes chez qui les symptômes ou le trouble dépressifs ont entraîné de l'isolement social, l'abandon d'activités ou l'inactivité, ou ont suivi un changement de situation ou de routine. Peut permettre d'obtenir du soutien de la part de pairs vivant des expériences similaires. Permet d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments. Implique de faire certaines activités et exercices à la maison.

Traitement	Mode de prestation	Principales caractéristiques	Autres points à considérer
4. Antidépresseurs	<p>Médicaments généralement utilisés pendant au moins six mois, incluant un certain temps après que les symptômes se sont résorbés.</p> <p>Il peut s'agir d'inhibiteurs sélectifs du recaptage de la sérotonine (ISRS), d'inhibiteurs du recaptage de la sérotonine et de la noradrénaline (IRSN) ou d'un autre antidépresseur si indiqué selon les antécédents cliniques et thérapeutiques.</p>	<p>Modifie la transmission neuronale dans le cerveau.</p>	<p>Engagement de temps minime bien que des rencontres de suivi régulières soient nécessaires (en particulier au début et à l'arrêt du traitement).</p> <p>Les bienfaits devraient commencer à se faire sentir à l'intérieur de quatre semaines.</p> <p>Le médicament peut avoir des effets indésirables et certaines personnes peuvent trouver difficile d'arrêter les antidépresseurs par la suite.</p>
5. Résolution de problèmes individuelle	<p>Traitement individuel offert par un intervenant.</p> <p>Consiste généralement en 6 à 12 rencontres régulières.</p>	<p>Accent mis sur l'identification des problèmes, la recherche de solutions alternatives, le choix de la meilleure option, l'élaboration d'un plan et l'évaluation de sa contribution à la résolution du problème.</p> <p>Orientée sur un objectif et structurée.</p> <p>Axée sur la résolution des problèmes actuels.</p>	<p>Peut être aidante pour les personnes qui veulent surmonter leurs difficultés actuelles et améliorer leurs expériences futures.</p> <p>Évite les effets indésirables potentiels des médicaments.</p> <p>La personne devra être disposée à faire des exercices à la maison.</p>
6. Counseling	<p>Traitement individuel offert par un intervenant.</p> <p>Consiste généralement en 12 à 16 rencontres régulières.</p>	<p>Accent placé sur explorer, donner un sens et gérer les émotions (« <i>emotional processing</i> ») afin d'aider la personne à trouver ses propres solutions et à développer des mécanismes d'adaptation.</p> <p>Axée sur l'écoute empathique, la facilitation de l'exploration des émotions ainsi que de l'encouragement.</p> <p>Utilisation, dans un cadre de collaboration, d'activités axées sur les émotions afin d'accroître la conscience de soi, aider la personne à mieux se comprendre, à mieux comprendre ses réactions aux autres.</p> <p>Pas de conseils spécifiques pour changer son comportement.</p>	<p>Peut être utile pour les personnes vivant des problèmes psychosociaux, relationnels ou professionnels qui contribuent aux symptômes ou au trouble dépressifs.</p> <p>Peut convenir aux personnes qui n'aiment pas parler de leurs symptômes ou de leur trouble dépressifs en groupe.</p> <p>Permet d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments.</p>

Traitement	Mode de prestation	Principales caractéristiques	Autres points à considérer
<p>7. Intervention basée sur l'approche psychodynamique ou psychothérapie psychodynamique brève</p>	<p>Traitement individuel offert par un intervenant formé. Consiste généralement en 16 rencontres régulières.</p>	<p>Accent mis sur la reconnaissance des émotions difficiles vécues dans le cadre de relations significatives et de situations stressantes, ainsi que sur l'identification de la manière avec laquelle les schèmes (<i>patterns</i>) peuvent se répéter.</p> <p>Axée à la fois sur l'introspection et sur les émotions.</p> <p>La relation entre l'intervenant et la personne qui présente des symptômes ou un trouble dépressifs, est considérée comme centrale pour soutenir le travail effectué sur les principaux conflits actuels.</p>	<p>Peut être utile pour les personnes ayant des relations affectées par des difficultés émotionnelles issues de leur développement psychique et contribuant à leurs symptômes ou au trouble dépressifs.</p> <p>Peut moins convenir aux personnes qui ne veulent pas mettre l'accent sur leurs propres émotions ou encore, qui ne souhaitent pas ou ne se sentent pas prêtes à discuter de leurs relations familiales ou avec des proches.</p> <p>Peut convenir aux personnes qui n'aiment pas parler de leurs symptômes ou de leur trouble dépressifs en groupe.</p> <p>Met l'accent sur des expériences douloureuses vécues dans le cadre de relations avec les proches et la famille peut être bouleversant dans un premier temps.</p> <p>Permet d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments.</p>
<p>8. Thérapie interpersonnelle (IPT)</p>	<p>Traitement individuel offert par un intervenant. Consiste généralement en 16 rencontres régulières.</p>	<p>Accent mis sur l'identification de la manière avec laquelle les relations ou situations interpersonnelles sont reliées aux humeurs dépressives, de même que sur l'exploration des émotions et la modification des réactions sur le plan interpersonnel.</p> <p>Approche structurée et axée sur la résolution des problèmes actuels.</p> <p>L'objectif est de changer les schèmes (<i>patterns</i>) relationnels plutôt que de cibler directement les pensées dépressives qui y sont associées.</p>	<p>Peut être aidante pour les personnes chez qui les symptômes ou le trouble dépressifs sont associés à des difficultés interpersonnelles, en particulier celles qui doivent s'adapter à une transition relationnelle, à un deuil ou à un changement de rôle interpersonnel.</p> <p>Peut convenir aux personnes qui n'aiment pas parler de leurs symptômes ou de leur trouble dépressifs en groupe.</p> <p>Nécessite une volonté d'explorer les relations interpersonnelles.</p> <p>Permet d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments.</p>

Traitement	Mode de prestation	Principales caractéristiques	Autres points à considérer
<p>9. Autosoins dirigés</p>	<p>Matériel (imprimé ou numérique) qui tient compte des principes des autosoins dirigés, incluant du contenu basé sur l'approche cognitivo-comportementale structurée, sur l'activation comportementale (AC) structurée et sur la résolution de problèmes ou l'éducation psychologique.</p> <p>Peut être offert en personne, par téléphone ou en ligne.</p> <p>Soutien d'un intervenant qui facilite le déroulement des autosoins, encourage la personne à les compléter et passe en revue les progrès réalisés et les résultats.</p> <p>Consistent généralement en six à huit rencontres structurées et régulières.</p>	<p>Axés sur la manière dont les pensées, les croyances, les attitudes, les émotions et le comportement interagissent ainsi que sur l'apprentissage de capacités d'adaptation permettant de composer différemment avec les situations de la vie.</p> <p>Orientés sur un objectif et structurés.</p> <p>Axés sur la résolution des problèmes actuels.</p>	<p>Peuvent convenir aux personnes qui n'aiment pas parler de leurs symptômes ou de leur trouble dépressifs en groupe.</p> <p>Nécessitent une certaine motivation et une volonté de travailler seul (bien qu'un soutien régulier soit offert).</p> <p>Permettent une certaine flexibilité quant à l'intégration du traitement aux autres obligations personnelles.</p> <p>Nécessitent l'accès et la capacité à utiliser un ordinateur, pour les documents en format numérique.</p> <p>Moins facile d'adapter le traitement à chaque personne, comparé à d'autres traitements.</p> <p>Permettent d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments.</p> <p>Moins de contacts réguliers avec un intervenant.</p>
<p>10. Programme d'activité physique (en groupe)</p>	<p>Traitement comportant la pratique d'activité physique en groupe et offert par un intervenant ayant reçu une formation pertinente.</p> <p>Fait appel à un programme d'activité physique conçu spécialement pour les personnes qui présentent des symptômes ou un trouble dépressifs.</p> <p>Consiste généralement en plus d'une rencontre par semaine pendant 10 semaines.</p> <p>Comprend généralement huit participants par groupe.</p>	<p>Intègre de l'activité physique aérobique d'intensité modérée.</p> <p>Ne cible pas directement les pensées et les émotions.</p>	<p>Peut permettre d'obtenir du soutien de la part de pairs vivant des expériences similaires.</p> <p>Peut devoir être adapté pour les personnes présentant des problèmes de santé physique rendant difficile la pratique d'activité physique.</p> <p>Peut également devoir être adapté pour tenir compte d'aspects psychologiques, tels que l'anxiété ou la honte, pouvant être des obstacles à l'engagement.</p> <p>Nécessite un investissement de temps considérable.</p> <p>Peut également s'avérer bénéfique sur le plan de la santé physique.</p> <p>Permet d'éviter les effets indésirables potentiels des médicaments.</p> <p>Moins de contacts réguliers avec un intervenant.</p>