

**TEMPS D'ATTENTE DU RÉSULTAT DE L'ANALYSE DE LA CARCASSE
AVANT DE DÉBUTER LA PROPHYLAXIE POSTEXPOSITION (PPE)**

Animal impliqué	Site de la morsure	Comportement	Niveau de risque dans le secteur géographique ¹	Temps d'attente (à partir de la morsure)
 DOMESTIQUE	Tête et cou		Élevé	Le plus court possible (Max 24h)
			Faible	
	Normal	Élevé	48 h	
		Faible	Jusqu'au résultat ²	
	Autres sites		Élevé	48 h
			Faible	48 h
Normal		Élevé	48 h	
		Faible	Jusqu'au résultat ²	
 SAUVAGE (incluant chauve-souris³)	Tête et cou		Élevé	Le plus court possible (Max 24h)
			Faible³	
	Normal	Élevé	Le plus court possible (Max 24h)	
		Faible³	48 h	
	Autres sites		Élevé	48 h
			Faible³	48 h
Normal		Élevé	48 h	
		Faible³	Jusqu'au résultat ²	
 GROS RONGEUR / LAGOMORPHE	Tête et cou		Élevé	Le plus court possible (Max 24h)
			Faible	48 h
		Normal	Élevé	48 h
			Faible	Jusqu'au résultat ⁴
	Autres sites		Élevé	48 h
			Faible	72 h
		Normal	Élevé	48 h
			Faible	Jusqu'au résultat ⁴

 **Comportement compatible avec la rage** : agressivité inhabituelle ou difficulté à marcher/voler ou paralysie ou démarche chancelante ou familiarité anormale avec l'humain. Au besoin, vérifier auprès du MAPAQ ou du MELCCFP dont les coordonnées sont disponibles dans l'[Aide à la décision – Gestion des expositions à risque de rage](#).

1 Pour connaître la présence de rage ou le niveau de risque du secteur géographique d'où provient l'animal, consultez le site Web de l'INSPQ, à l'adresse suivante : www.inspq.qc.ca/zoonoses/rage.

2 Attendre le résultat de l'analyse de la carcasse de l'animal.

3 Le risque de rage chez la chauve-souris est **élevé** sur tout le territoire du Québec.

4 Dans ces circonstances, l'analyse de l'animal n'est pas nécessaire, mais si elle est demandée, la PPE peut attendre le résultat de l'analyse.