

OUTIL DÉCISIONNEL POUR L'INFIRMIÈRE AU TRIAGE DE L'URGENCE

PARTIE 1 – CONFIRMATION LABORATOIRE OU CLINIQUE

- Avez-vous reçu un diagnostic de la COVID-19 (**test de dépistage positif**) dans les 3 derniers mois?

Si NON → Passer à la PARTIE 2

Si OUI dans les 10 derniers jours → Cas confirmé et passer à la PARTIE 3

Si OUI et > 10 jours → Valider si « rétabli » (voir Annexe 1^{ère} puce) : Si rétabli → cas non suspecté et passer à la PARTIE 4 | Si non rétabli → cas confirmé et passer à la PARTIE 3

PARTIE 2 – CRITÈRES D'EXPOSITION ET CRITÈRES CLINIQUES

- Avez-vous eu une exposition à risque modéré ou élevé à la COVID-19 dans les 14 derniers jours?

- Personne vivant sous le même toit ou partenaire intime d'une personne confirmée de la COVID-19;
- Contact prolongé (> 15 minutes cumulatives ou continues), à moins de 2 mètres, avec une personne confirmée de la COVID-19 (sans port du masque chirurgical ou médical);
- Personne prodiguant des soins corporels à un cas confirmé de la COVID-19 ou personnel soignant en contact direct avec un cas confirmé de la COVID-19 (sans port EPI approprié);
- Personnel ayant eu un contact direct avec des liquides biologiques infectieux (expectorations ou crachats reçus dans le visage, les yeux, etc.);
- Exposition dans un milieu identifié comme « en éclosion » par la santé publique (école, restaurant, résidence pour personnes âgées, milieu de travail, etc.);
- Séjour de plus de 48h dans un centre hospitalier en éclosion (hospitalisation ou urgence);
- Séjour de plus de 48h dans une zone considérée à risque (extérieur du Canada ou [région en palier orange ou rouge](#) lorsque la consultation a lieu dans une région verte ou jaune).

Si OUI → Cas suspecté et passer à la PARTIE 3 | Si NON → Passer à la question suivante

- Avez-vous 1 des symptômes suivants :
 - Fièvre (>38,1°C buccale)
 - Difficultés respiratoires, essoufflement (dyspnée)
 - Toux récente ou toux chronique exacerbée
 - Anosmie d'apparition brutale sans congestion nasale avec ou sans agueusie

OU au moins 2 des symptômes suivants :

- Fatigue intense
- Céphalée
- Otagie
- Douleur abdominale
- Nausées ou vomissements
- Douleurs musculaires généralisées
- Rhinorrhée
- Mal de gorge
- Diarrhée
- Perte d'appétit importante

Pour la clientèle 0-5 ans : Est-ce que l'enfant présente un des symptômes ou regroupement de symptômes suivants?

- Fièvre ≥ 38.5 C (rectale)
- Rhinorrhée ou congestion nasale ou mal de gorge **ET** fièvre ≥ 38.1 C (rectale)
- Symptômes respiratoires : toux nouvelle ou aggravée, difficulté à respirer
- Douleurs abdominales, vomissements ou diarrhée **ET** fièvre ≥ 38.1 C (rectale)

Si OUI** → Cas suspecté et passer à la PARTIE 3 | Si NON → Cas non suspecté et passer à la PARTIE 4

PARTIE 3 – PRISE EN CHARGE DES CAS SUSPECTÉS (Zone tiède) OU CONFIRMÉS (Zone chaude)

1. Faire porter un masque de procédure à l'utilisateur;
2. Placer l'utilisateur dans une pièce individuelle avec la porte fermée si disponible, sinon à plus de 2 mètres des autres usagers (voir Annexe 2^e puce pour l'orientation en zone tiède);
3. Mesures contre la transmission par gouttelettes/contact avec protection oculaire;
4. Si usagers susceptibles d'avoir une [IMGA](#) : Précautions aériennes-contact avec protection oculaire et isolement en chambre à pression négative si disponible (sinon pièce fermée).
5. **Réorientation** : Réorienter si possible les cas réorientables en clinique désignée d'évaluation (CDÉ) via RVSQ.

PARTIE 4 – PRISE EN CHARGE DES CAS NON SUSPECTÉS OU « RÉTABLIS » (Zone froide)

Régions en palier vert ou jaune : Tous les travailleurs de la santé qui sont à moins de 2 mètres de l'utilisateur doivent porter un masque de procédure.

Régions en palier orange ou rouge : Tous les travailleurs de la santé qui sont à moins de 2 mètres doivent porter un masque de procédure et une protection oculaire.

Réorientation : Réorienter si possible les cas réorientables en clinique froide (à l'exception des usagers présentant tous symptômes infectieux qui doivent être redirigés vers les CDÉ).

Annexe

1. Réadmission d'un usager « rétabli » ayant eu un diagnostic antérieur de la COVID-19

Situation de l'usager « rétabli »		Prise en charge
<p><u>MALADIE LÉGÈRE OU MODÉRÉE</u></p> <p>Plus de 10 jours après le début des symptômes</p>	<p>Usager COVID confirmée (test de laboratoire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • qui rencontre le délai de 10 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles) 	Admettre en zone froide
<p><u>MALADIE SÉVÈRE (ADMIS À USI EN LIEN AVEC LA COVID-19)</u></p> <p>Plus de 21 jours après le début des symptômes</p>	<p>Usager COVID confirmée (test de laboratoire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • qui rencontre le délai de 21 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles) 	Admettre en zone froide
<p><u>USAGER IMMUNOSUPPRIMÉ</u></p> <p>Plus de 21 jours et moins de 28 jours après le début des symptômes</p>	<p>Usager COVID confirmée (test de laboratoire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • qui rencontre le délai de plus de 21 jours, mais moins de 28 jours post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles) • et n'ayant pas eu de test de laboratoire de contrôle 	<p>Admettre en zone chaude et</p> <ul style="list-style-type: none"> • Attendre le délai de 28 jours après le début des symptômes puis transférer en zone froide. <p>OU</p> <ul style="list-style-type: none"> • Réaliser un test de laboratoire de contrôle : <ul style="list-style-type: none"> ○ Si positif : attendre le délai de 28 jours après le début des symptômes puis transférer en zone froide ○ Si 2 PCR négatifs (à 24 heures d'intervalle) : transférer en zone froide
<p><u>USAGER IMMUNOSUPPRIMÉ</u></p> <p>Plus de 28 jours après le début des symptômes</p>	<p>COVID confirmée (test de laboratoire)</p> <ul style="list-style-type: none"> • qui rencontre le délai de 28 jours, post début des symptômes avec absence de fièvre* depuis 48 heures et amélioration du tableau clinique depuis 24 heures (excluant toux, anosmie ou agueusie résiduelles) 	Admettre en zone froide

* Sans prise d'antipyrétique

2. Orientation des patients suspectés en zone tiède

Sans créer des sous-sections physiquement distinctes dans la zone tiède, il faut, **dans la mesure du possible**, diminuer la proximité des usagers suspectés à « risque FAIBLE OU MODÉRÉ » des usagers à « risque ÉLEVÉ ».

COVID-19 Suspecté « Risque Élevé »	Tableau clinique positif (+) + critères d'exposition positifs (+)
COVID-19 Suspecté « Risque Faible ou Modéré »	Tableau clinique positif (+) + critères d'exposition négatifs (-) Tableau clinique négatif (-) + critères d'exposition positifs (+)