# FORMULAIRE DE RÉFÉRENCE EN CDÉ (mise à jour, 22 juin 2021)

Les critères suivants permettent de cibler la clientèle devant être vue en CDÉ, mais ne sont pas les critères de diagnostic du COVID-19. Des informations complémentaires suivent le formulaire.

| **ÉVALUATION DES CRITÈRES DES CLINIQUES DÉSIGNÉES D'ÉVALUATION (CDÉ)** | |
|---|---|
| **INFORMATION PATIENT** | |
| **Nom, prénom :** | **Date de naissance :** |
| **Adresse complète :** | |
| **Adresse courriel :** | **No. Téléphone :** |
| **Nom, prénom du père :** | |
| **Nom, prénom de la mère :** | |
| **Numéro d'assurance-maladie / date expiration :** | |
| **INFORMATION DU PROFESSIONNEL SOIGNANT** | |
| **Nom et numéro de pratique du professionnel référent :** | |
| **No de télécopieur (pour retour note CDÉ au md) :** | **Téléphone ligne directe :** |
| **Répond aux critères de référence en CDÉ** : | |
| **CRITÈRES DE RÉFÉRENCE EN CDÉ (Obligatoire)**<br>**Excluant les symptômes associés à la vaccination pour la COVID-19 (voir algorithme #1, page 3, INSPQ)[1]** | |
| **Référer en CDÉ tout patient, répondant au moins à l'un des deux critères suivants (cocher toutes les cases appropriées) :** | |
| ☐ **1) CRITÈRES CLINIQUES : le patient présente ≥ 1 SYMPTÔME(S) parmi les suivants**<br>☐ Fièvre (>38);<br>☐ Toux (récente ou chronique exacerbée);<br>☐ Difficultés respiratoires;<br>☐ Anosmie d'apparition soudaine sans congestion nasale, avec ou sans agueusie;<br>☐ Mal de gorge;<br>**OU présente ≥ 2 SYMPTÔMES parmi les suivants:**<br>☐ Douleur musculaire généralisée non reliée à un effort physique;<br>☐ Céphalée;<br>☐ Fatigue marquée;<br>☐ Perte d'appétit importante;<br>☐ Douleur abdominale;<br>☐ Vomissement ou nausée;<br>☐ Diarrhée (nouvelle ou exacerbée). | |
| ☐ **2) CRITÈRES D'EXPOSITION (excluant les patients qui ont reçu deux doses de vaccin il y a plus de 7 jours, qui ont eu un résultat positif à la COVID-19 dans les 6 derniers mois ou qui ont un résultat positif à la COVID-19 + une dose de vaccin)**<br>☐ Contact domiciliaire : personne asymptomatique habitant avec une personne qui présente des symptômes de la **COVID -19** (sauf si la personne contact a reçu un résultat négatif d'un test);<br>☐ Patient ayant reçu un diagnostic de **COVID-19** dans les **10 DERNIERS JOURS** (**28 jours** si patient immunosupprimé, **21 jours** si patient ayant séjourné aux soins intensifs); | |

[1] https://www.inspq.qc.ca/publications/3095-symptomes-postvaccination-covid-milieux-soins-covid19

- ☐ Patient ayant reçu un diagnostic de **COVID-19** depuis **plus de 10 jours** (**28 jours** si patient immunosupprimé, **21 jours** si patient ayant séjourné aux soins intensifs) et qui ne répond **PAS** aux critères suivants :
  - absence de température X 48h (sans prise d'antipyrétique)
    **ET**
  - amélioration des symptômes x 24 h (excluant toux, anosmie ou agueusie);
- ☐ Contact d'un cas de COVID-19 prouvé dans les **14 derniers jours**;
- ☐ Séjour de **≥ 48 h** à l'urgence ou l'hôpital dans les **14 derniers jours**;
- ☐ Séjour de **≥ 48 h** à l'extérieur du Canada; Patient contacté par la Santé publique ou visé par une annonce populationnelle de la Santé publique.

**Clientèle exclue des CDÉ** (à orienter vers les urgences)

- Fièvre :
  - Enfants 0 à 3 mois et température rectale ≥ 38 degrés Celsius;
  - Enfants de 3 à 6 mois et température rectale ≥ 39 degrés Celsius, selon l'évaluation clinique d'un professionnel de la santé. Référer à Info-Santé pour une évaluation au besoin;
- Clientèle non réorientable de l'urgence.

**Vigilance accrue pour des patients vus en CDÉ qui présenteraient les signes de gravité et risques de dégradation suivants :**

| SIGNE DE GRAVITÉ ET RISQUE DE DÉGRADATION |
|---|
| • Température : > 38,2 degrés Celsius<br>• Fréquence cardiaque : > 100 bpm<br>• Rythme et qualité respiratoire : RR > 22 respirations / minute ou tirage ou amplitude<br>• Saturométrie : < 92 % (patient sans pneumopathie usuelle);<br>• Tension artérielle : < 90 mm Hg (adulte)<br>• Altération de la conscience, confusion, somnolence<br>• Déshydratation ou orthostatisme<br>• Altération inhabituelle ou soudaine de l'état général; brutal chez le sujet âgé<br>• Éveil et acuité de réponse anormale<br><br>***Toute condition urgente ou sévère devrait être dirigée à l'urgence par le moyen approprié (911 ou autre).** |