

Coronavirus (COVID-19)

DIRECTION GÉNÉRALE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

Date : Le 12 octobre 2021

Nature : ☒ **Recommandations** ☐ **Propositions** ☐ **Présentation** ☐ **Avis**

Sujet : Recommandation relative à l'équipement de protection individuelle requis pour la réalisation de tests rapides en milieu scolaire

Mise en contexte – Programme de tests rapides en milieu scolaire

Actuellement, la COVID-19 n'est pas prédominante chez les jeunes d'âge scolaire (primaire). D'autres virus respiratoires sont prévalents chez les jeunes (virus respiratoire syncytial, rhinovirus et virus parainfluenza, notamment). Les symptômes identifiés (écoulement nasal, etc.) ont donc une plus grande probabilité d'être associés à d'autres virus qu'à la COVID-19.

Caractéristiques du prélèvement en milieu scolaire

Le test rapide Panbio en milieu scolaire sera réalisé à partir d'un prélèvement qui diffère de celui réalisé en Centre de dépistage (CDD). Il sera nasal, plutôt que nasopharyngé. C'est un prélèvement moins invasif et non générateur d'aérosols.

Considérant que :

- Contrairement au travailleur œuvrant dans un CDD ou en milieu de soins, le travailleur en milieu scolaire est appelé à tester des enfants présentant divers symptômes (et non seulement des symptômes spécifiques à la COVID), nous ne qualifierons donc pas ces derniers de « présomptifs positifs à la COVID » ;
- Le travailleur, contrairement à celui en CDD ou en milieu de soins, n'est en contact que quelques minutes par jour (voire par semaine) avec des enfants symptomatiques (et seulement pour une courte période de quelques minutes) ;
- Contrairement à la situation vécue à pareille date l'an passé, circulent présentement plusieurs virus respiratoires, autres que la COVID-19 ;
 - Dans ce contexte, la probabilité de rencontrer un enfant symptomatique et positif à la COVID-19 demeure relativement faible ;

- Au moment de faire le prélèvement, le travailleur ne se trouvera que quelques secondes (moins de 10) à moins de deux mètres de l'enfant testé ;
- Au moment de faire le prélèvement, l'enfant porte son masque et l'abaisse de son nez, mais le conserve sur la bouche ;
- Le prélèvement nasal ne provoque ni toux (contrairement au nasopharyngé), ni expulsion de gouttelettes (contrairement au gargarisme) ;
- Le travailleur est doublement vacciné, porte les lunettes, le masque d'intervention de qualité médicale, la blouse et les gants ;

En conséquence, nous recommandons que :

- Dans la mesure où le travailleur qui effectue le test est doublement vacciné, le port des lunettes, du masque d'intervention de qualité médicale, de la blouse et des gants constitue une protection adéquate ;
- Il est requis que les outils et communications en lien avec le programme de dépistage rapide en milieu scolaire soient adaptés afin de refléter cette position.

Ces recommandations peuvent être mises en application dès que cela sera possible.

Approuvé par le directeur national de santé publique, M. Horacio Arruda, le 12 octobre 2021.

Signature :



N/Réf. : 21-SP-00306-43