

Vaccin injectable contre la grippe

| Septembre 2018 |

La vaccination,
la meilleure protection

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre la grippe et ses complications. Ce vaccin ne protège pas contre le rhume et les infections respiratoires causées par d'autres virus.



Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Grippe	<ul style="list-style-type: none">• Fièvre• Toux• Fatigue• Mal de tête• Douleur musculaire• Nausées, vomissements, diarrhée• Atteinte de l'état général	<ul style="list-style-type: none">• Otite• Sinusite• Bronchite• Pneumonie• Décès

IMPORTANT

C'est à vous de prendre rendez-vous au CLSC ou chez votre médecin pour faire vacciner votre enfant.

Prochain rendez-vous
pour la vaccination :

Renseignements sur le vaccin injectable contre la grippe

La vaccination est le meilleur moyen de protéger votre enfant contre la grippe et ses complications. Les risques de complications de la grippe sont plus grands pour les enfants âgés de 6 mois et plus qui sont atteints d'une maladie chronique et pour les bébés de moins de 6 mois. Ce vaccin peut être donné dès l'âge de 6 mois. La vaccination contre la grippe est également recommandée aux personnes qui peuvent leur transmettre la maladie, c'est-à-dire à leurs proches qui vivent sous le même toit et à leurs aidants naturels.

Ce vaccin doit être administré chaque année à l'automne. Pour un enfant âgé de moins de 9 ans, 2 doses du vaccin à 1 mois d'intervalle sont nécessaires lorsqu'il s'agit d'une 1^{re} vaccination contre la grippe.

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin injectable contre la grippe est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorité des cas (plus de 50 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none">• Douleur à l'endroit où l'injection a été faite	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.
Très souvent (moins de 50 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none">• Rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite• Douleur musculaire, douleur aux jointures, fatigue• Perte d'appétit, somnolence (envie de dormir), irritabilité	
Souvent (moins de 10 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none">• Bleu ou démangeaison à l'endroit où l'injection a été faite• Fièvre, frissons et malaises, particulièrement chez les personnes vaccinées pour la 1^{re} fois contre la grippe• Nausées, vomissements, diarrhée, maux de ventre	
Parfois (moins de 1 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none">• Rougeurs sur la peau• Étourdissements	
Rarement (moins de 1 enfant sur 1 000)	<ul style="list-style-type: none">• Yeux rouges, mal de gorge, toux, difficulté à respirer ou enflure du visage; ce qu'on appelle le <i>syndrome oculorespiratoire</i> (SOR)• Convulsions• Engourdissements, névralgie (douleur sur le trajet d'un nerf)	

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

POUR TOUTE QUESTION,

adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.

Vous pouvez également consulter le site Quebec.ca/vaccination