

# Vaccin HB

Vaccin contre l'hépatite B

| Juin 2024 |

La vaccination,  
la meilleure protection

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l'hépatite B et ses complications.

L'hépatite B est une infection du foie causée par un virus (le virus de l'hépatite B).



Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Hépatite B</b>	L'hépatite B se transmet par le contact d'une muqueuse (ex. : la bouche, les organes génitaux) ou d'une plaie avec le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée.	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fièvre</li><li>• Maux de ventre</li><li>• Jaunisse</li><li>• Vomissements</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Atteinte grave du foie</li><li>• Infection chronique du foie (10 % des adultes et jusqu'à 90 % des bébés)</li><li>• Cirrhose</li><li>• Cancer du foie</li><li>• Décès (1 % des cas)</li></ul>

# Renseignements sur le vaccin contre l'hépatite B

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l'hépatite B et ses complications. Le vaccin est indiqué pour toute personne qui désire réduire son risque d'attraper l'hépatite B. Plusieurs doses du vaccin sont nécessaires pour avoir la meilleure protection possible. Depuis septembre 2020, le calendrier de vaccination prévoit l'administration d'une dose de ce vaccin en secondaire 3.

**Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).**

**Le vaccin contre l'hépatite B est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.**

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Souvent (moins de 10 % des enfants)	<ul style="list-style-type: none"><li>• Douleur, rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>• Mal de tête, problèmes digestifs, étourdissements, fatigue</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li><li>• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li><li>• Consulter un professionnel de la santé selon la gravité des symptômes.</li></ul>

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

## POUR TOUTE QUESTION,

adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 811 ou un professionnel de la santé.

Vous pouvez également consulter le site [Québec.ca/vaccination](https://quebec.ca/vaccination)