

Vaccin HAHB

| Juin 2025 |

Vaccin combiné contre l'hépatite A et l'hépatite B

La vaccination,
la meilleure protection

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre l'hépatite A, l'hépatite B et leurs complications.



Maladies	Signes et symptômes	Complications possibles
Hépatite A	• Le plus souvent asymptomatique chez les enfants de moins de 5 ans • Lorsqu'ils se manifestent, les symptômes sont les suivants : - Fièvre - Fatigue - Perte d'appétit - Jaunisse	• Fatigue persistante (plusieurs semaines) • Atteinte grave du foie • Décès (très rare chez l'enfant)
Hépatite B	• Fièvre • Maux de ventre • Jaunisse • Vomissements	• Atteinte grave du foie • Infection chronique du foie (10 % des adultes et jusqu'à 90 % des bébés) • Cirrhose • Cancer du foie • Décès (1 % des cas)

IMPORTANT

C'est à vous de prendre rendez-vous pour faire vacciner votre enfant en ligne sur [Quebec.ca/vaccination](https://quebec.ca/vaccination) ou en téléphonant au 1 877 644-4545.

Prochain rendez-vous
pour la vaccination :

Renseignements sur le vaccin HAHB

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l'hépatite A, l'hépatite B et leurs complications. Pour obtenir la protection contre l'hépatite B, votre enfant doit recevoir 2 doses du vaccin DCaT-HB-VPI-Hib à 2 mois et 4 mois puis 1 dose du vaccin HAHB à l'âge de 18 mois. Pour obtenir la protection contre l'hépatite A, votre enfant doit recevoir le vaccin HAHB à 18 mois.

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite). D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin HAHB est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Très souvent (moins de 50 % des enfants)	• Douleur, gonflement, rougeur à l'endroit où l'injection a été faite	• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.
Souvent (moins de 10 % des enfants)	• Rougeur et gonflement de plus de 3 cm d'une durée de plus de 24 heures • Fièvre, maux de tête, fatigue, nausées, vomissements	• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin. • Consulter un professionnel de la santé selon la gravité des symptômes.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

POUR TOUTE QUESTION,

adressez-vous à la personne qui donne le vaccin,
ou consultez Info-Santé 811 ou un professionnel de la santé.