

Vaccin contre le rotavirus

| Juin 2025 |

La vaccination,
la meilleure protection

En faisant vacciner votre enfant, vous le protégez contre les gastroentérites causées par le rotavirus et leurs complications. Avant la vaccination, plus de 95 % des enfants souffraient d'une gastroentérite à rotavirus avant l'âge de 5 ans.



Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Rotavirus	• Diarrhée • Vomissements • Fièvre	• Déshydratation • Hospitalisation pour soigner la déshydratation (au Québec, avant la vaccination, on comptait de 900 à 1 500 hospitalisations par année à cause du rotavirus)

IMPORTANT

C'est à vous de prendre rendez-vous pour faire vacciner votre enfant en ligne sur [Québec.ca/vaccination](https://quebec.ca/vaccination) ou en téléphonant au 1 877 644-4545.

Prochain rendez-vous
pour la vaccination :

Renseignements sur le vaccin contre le rotavirus

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les gastroentérites causées par le rotavirus et leurs complications. La 1^{re} dose doit être administrée avant l'âge de 20 semaines et la 2^e dose doit l'être avant l'âge de 8 mois.

Comme le virus contenu dans le vaccin peut se retrouver dans les selles pendant une dizaine de jours après la vaccination, il est important de bien se laver les mains lors du changement de couches.

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin. D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin contre le rotavirus est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Fréquence	Réactions connues causées par ce vaccin	Ce qu'il faut faire
Souvent (moins de 10 % des enfants)	• Diarrhée ou vomissements	• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les maux de tête au besoin. • Consulter un professionnel de la santé selon la gravité des symptômes.
Très rarement (1 à 7 enfants sur 100 000)	• Il est possible que le vaccin amène, dans la semaine qui suit la vaccination, une invagination intestinale, c'est-à-dire une forme d'obstruction de l'intestin qui se traite à l'hôpital.	

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

POUR TOUTE QUESTION,

adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 811 ou un professionnel de la santé.

Vous pouvez également consulter le site
Québec.ca/vaccination