

MOLLUSCUM CONTAGIOSUM

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Définition

Le molluscum contagiosum est une infection cutanée bénigne causée par un virus du groupe des poxvirus.

Épidémiologie

Les humains sont la seule source connue du virus.

C'est une infection commune à travers le monde. L'incidence est plus élevée chez les enfants de moins de 5 ans et chez ceux qui ont de l'eczéma.

Tableau clinique

Le molluscum contagiosum se manifeste par des papules ombiliquées de 2 à 5 mm de diamètre, allant du rose perlé au blanc, habituellement au nombre de 1 à 20. Elles ne causent généralement pas de prurit ni de douleur. Chez 10 % des patients, on observe une eczématisation de la peau autour des lésions.

Chez les enfants, les lésions se localisent au visage, au tronc et aux membres supérieurs. Chez les adultes, les lésions se localisent plus souvent aux organes génitaux.

Complications

En général, les lésions provoquées par le molluscum contagiosum guérissent sans laisser de cicatrices. La surinfection est peu fréquente en raison de l'absence de prurit.

Les personnes immunosupprimées ou infectées par le VIH ont tendance à avoir des lésions qui sont plus étendues et qui durent plus longtemps.

Durée de la maladie

Si elles ne sont pas traitées, les lésions causées par le molluscum contagiosum disparaissent spontanément après une période de 6 à 12 mois, mais elles peuvent persister jusqu'à 4 ans avant de disparaître complètement (en moyenne, 8 mois).

Modes de transmission

La transmission se fait :

- Par contact direct avec la peau (lésions cutanées d'une autre personne ou contact sexuel).
- Par contact indirect avec des objets contaminés (serviettes, éponges, équipements sportifs, etc.).
- Par auto-inoculation : la personne qui présente des lésions peut propager l'infection à d'autres régions de sa peau, habituellement à la suite du grattage ou de la manipulation des lésions.

Période d'incubation

La période d'incubation dure en général de 2 à 7 semaines, mais peut aller jusqu'à 6 mois.

Période de contagiosité

La période de contagiosité dure probablement tant que les lésions persistent.

Réceptivité

Tout le monde est susceptible de contracter le molluscum contagiosum.

Immunité

Le molluscum contagiosum ne confère aucune immunité.

Il n'existe aucun vaccin contre le molluscum contagiosum.

Méthodes diagnostiques

Tableau clinique.

Traitement**◆ Spécifique**

- Il n'y a pas de consensus sur le traitement du molluscum contagiosum chez les enfants et les adolescents. Les lésions génitales devraient être traitées pour éviter la dissémination par contact sexuel.
- Dans la majorité des cas, les lésions non génitales guérissent spontanément. Toutefois, pour des raisons esthétiques, pour prévenir la propagation ainsi que l'auto-inoculation et pour diminuer la durée de la maladie, on peut opter pour un des traitements suivants : curetage sous anesthésie locale, cryothérapie, application topique d'agents kératolytiques.

◆ De soutien

Aucun.

MESURES À PRENDRE**Enquête**

Aucune.



Mesures de contrôle◆ **Sujet**

- Ne pas exclure le sujet.
- Si possible, couvrir les lésions exposées d'un pansement adhésif à l'épreuve de l'eau, lors d'activités de contact ou de la baignade.
- Éviter de toucher les lésions.

◆ **Contacts**

Éviter le contact avec les lésions.

Mesures d'hygiène et environnement

Pictogrammes	Références
	Chapitre 4, section : Hygiène des mains .
	Chapitre 4, section : Entretien, hygiène et salubrité des objets, des surfaces et des locaux . Annexes 3 et 4 .

Suivi

Aucun.