

# Vaccin RRO

Vaccin combiné contre la rougeole, la rubéole et les oreillons

La vaccination,  
la meilleure protection



La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et leurs complications.

Maladies	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Rougeole</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rougeurs</li> <li>• Toux</li> <li>• Fièvre</li> <li>• Conjonctivite (yeux rouges)</li> <li>• Atteinte de l'état général</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Otite (5 à 9 % des cas)</li> <li>• Pneumonie (1 à 5 % des cas)</li> <li>• Convulsions</li> <li>• Dommages permanents au cerveau (1 cas sur 1 000)</li> <li>• Décès (1 cas sur 3 000)</li> </ul>
<b>Rubéole</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Rougeurs</li> <li>• Enflure des ganglions</li> <li>• Arthrite, surtout chez les femmes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fausse couche chez la femme enceinte</li> <li>• Malformations chez le bébé dont la mère a eu la rubéole pendant la grossesse</li> </ul>
<b>Oreillons</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fièvre</li> <li>• Mal de tête</li> <li>• Enflure des glandes situées près de la mâchoire</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Méningite (10 à 30 % des cas)</li> <li>• Surdit� (devenir sourd)</li> <li>• Infection des testicules</li> <li>• Infection des ovaires</li> </ul>

## Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre la rougeole, la rubéole, les oreillons et leurs complications. La protection contre ces maladies dure toute la vie.

Une femme qui reçoit le vaccin doit éviter de devenir enceinte au cours du mois suivant la vaccination.

## Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin RRO est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Fréquence	Réactions connues causées par ce vaccin	Ce qu'il faut faire
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douleurs aux jointures chez les adultes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li> <li>• Utiliser un médicament contre la fièvre ou les maux de tête au besoin.</li> <li>• Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li> </ul>
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Douleur, rougeur à l'endroit où l'injection a été faite</li> <li>• Rougeurs non contagieuses et fièvre modérée ou élevée entre la 5<sup>e</sup> et la 12<sup>e</sup> journée après la vaccination</li> <li>• Irritabilité, somnolence (envie de dormir), conjonctivite (yeux rouges)</li> <li>• Douleurs aux jointures chez les enfants</li> </ul>	
Parfois (moins de 1 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Frissons, enflure des ganglions et des glandes situées près de la mâchoire</li> </ul>	
Rarement (moins de 1 personne sur 1 000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Convulsions entre la 5<sup>e</sup> et la 12<sup>e</sup> journée après la vaccination</li> </ul>	
Très rarement (moins de 1 personne sur 10 000)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Diminution temporaire des cellules sanguines qui aident à la coagulation du sang</li> </ul>	
Moins de 1 personne sur 1 million	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Problèmes neurologiques</li> </ul>	

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**

