

# Vaccin contre le choléra et la diarrhée à ECET

La vaccination,  
la meilleure protection

Avril 2018

La personne qui reçoit ce vaccin se protège contre le choléra et la diarrhée causée par certaines souches de la bactérie ECET. Les souches contenues dans le vaccin sont retrouvées dans 5 à 20 % des cas de diarrhées causées par la bactérie ECET. Cette dernière cause environ 30 % des diarrhées des voyageurs dans les Caraïbes, en Amérique latine, en Afrique et dans le sous-continent indien. Le choléra survient très rarement chez les voyageurs. Ce vaccin peut être envisagé pour les voyageurs qui se rendent dans des régions où ils risquent d'attraper ces maladies.

Maladies	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Choléra</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le choléra se transmet par un contact avec de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne infectée par le choléra.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Diarrhée</li><li>Déshydratation</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Décès</li></ul>
<b>Diarrhée à ETEC</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>La diarrhée à ECET se transmet par un contact avec de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne infectée par la bactérie ECET.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Diarrhée</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Déshydratation</li></ul>

## Le vaccin

La vaccination est l'un des moyens de protection contre le choléra et la diarrhée causée par certaines souches de la bactérie ECET. Plusieurs doses du vaccin sont nécessaires pour avoir la meilleure protection possible.

En plus de la vaccination, il est important d'éviter la consommation d'eau et d'aliments susceptibles d'être contaminés ainsi que d'appliquer des mesures d'hygiène simples (lavage des mains et désinfection des objets souillés par des selles). Le vaccin doit être conservé au réfrigérateur. Aucun aliment ni aucun liquide ne doivent être pris 1 heure avant le vaccin et 1 heure après le vaccin.

Le vaccin se présente sous la forme d'une fiole contenant le vaccin (liquide) et d'un sachet contenant un tampon (granules). Pour prendre le vaccin :

- dissoudre le contenu du sachet de tampon dans environ 150 ml d'eau fraîche ;
- agiter la fiole contenant le vaccin et ajouter le vaccin à la solution de tampon (150 ml). Pour un enfant âgé de 2 à 6 ans, utiliser seulement la moitié de la solution de tampon (75 ml) et l'ajouter à la totalité du vaccin ;
- bien agiter et boire immédiatement ;

Il est recommandé de compléter la vaccination au moins 1 semaine avant le départ.

## Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin.

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin contre le choléra et la diarrhée à ECET est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

Réactions connues causées par ce vaccin	Ce qu'il faut faire
<ul style="list-style-type: none"><li>Les réactions causées par ce vaccin sont semblables à celles causées par un placebo.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li><li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>

Les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique grave survient après la prise du vaccin, consulter un médecin immédiatement.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**