

Immunoglobulines contre l'hépatite B (HBIG)

La vaccination,
la meilleure protection

Avril 2018

Les HBIG sont des anticorps obtenus à partir du sang de plusieurs donneurs. Elles protègent contre l'hépatite B et ses complications. L'hépatite B est une infection du foie causée par un virus. Il existe aussi un vaccin contre l'hépatite B qui peut être donné en même temps que les HBIG. Les HBIG protègent pendant quelques mois, alors que le vaccin protège pour de nombreuses années.

| Maladie | Transmission | Signes et symptômes | Complications possibles |
|------------|--|---|---|
| Hépatite B | <ul style="list-style-type: none">L'hépatite B se transmet par le contact d'une muqueuse (ex. : la bouche, les organes génitaux) ou d'une plaie avec le sang, le sperme ou les sécrétions vaginales d'une personne infectée. | <ul style="list-style-type: none">FièvreMaux de ventreJaunisseVomissements | <ul style="list-style-type: none">Atteinte grave du foieInfection chronique du foie (10 % des adultes et jusqu'à 90 % des bébés)CirrhoseCancer du foieDécès (1 % des cas) |

Les HBIG

Les HBIG sont un des moyens de protection contre l'hépatite B et ses complications. Les HBIG sont recommandées à certaines personnes de l'entourage d'une personne qui a l'hépatite B.

Les symptômes après l'immunisation

Des symptômes peuvent être causés par les HBIG (ex. : douleur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec les HBIG (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Les HBIG sont sécuritaires. Dans la majorité des cas, elles ne provoquent aucune réaction.

| Réactions possibles aux HBIG | Ce qu'il faut faire |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">Douleur et démangeaisons à l'endroit où l'injection a été faiteEnflure du visage | <ul style="list-style-type: none">Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.Utiliser un médicament contre la fièvre ou les maux de tête au besoin.Consulter un médecin selon la gravité des symptômes. |

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une immunisation avec des HBIG, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après l'immunisation. La personne qui donne les HBIG sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne les HBIG, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.