

# Immunoglobulines contre la rage (RIg)

La vaccination,  
la meilleure protection

Mai 2013

Les RIg sont des anticorps obtenus à partir du sang de plusieurs donneurs. Elles protègent contre la rage et ses complications. La rage est une maladie mortelle causée par un virus. Il existe aussi un vaccin contre la rage, qui peut être donné en même temps que les RIg.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Rage</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>La rage se transmet par la morsure d'un animal atteint de la rage ou le contact d'une plaie ou d'une muqueuse avec sa salive.</li></ul> <p><i>Après une exposition possible à la rage, il faut laver la plaie à l'eau et au savon pendant plusieurs minutes.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Douleur et engourdissements à l'endroit où la morsure a été faite</li><li>Agitation</li><li>Difficulté à avaler</li><li>Convulsions</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Décès</li></ul>

## Les RIg

Les RIg sont un des moyens de protection contre la rage et ses complications. Les RIg sont recommandées aux personnes qui ont possiblement été exposées au virus de la rage.

## Les symptômes après l'immunisation

Des symptômes peuvent être causés par les RIg (ex. : douleur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec les RIg (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Les RIg sont sécuritaires. Dans la majorité des cas, elles ne provoquent aucune réaction.

Réactions possibles aux RIg	Ce qu'il faut faire
<ul style="list-style-type: none"><li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>Enflure du visage</li><li>Fièvre, rougeurs sur la peau</li><li>Problème aux reins (rars cas rapportés)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li><li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.</li><li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une immunisation avec des RIg, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après l'immunisation. La personne qui donne les RIg sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne les RIg, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**