

Vaccin contre le méningocoque de sérotype B

La vaccination,
la meilleure protection

Août 2020

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de sérotype B et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves causées par le méningocoque de sérotype B. Il existe différents sérotypes (ou types) de méningocoque, entre autres les sérotypes A, B, C, W et Y. Ce vaccin protège contre le sérotype B.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Infection à méningocoque de sérotype B	<ul style="list-style-type: none">• Forte fièvre• Mal de tête important• Nausées et vomissements• Atteinte de l'état général• Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau	<ul style="list-style-type: none">• Surdit�• Cicatrices• Dommages permanents au cerveau• Amputation des mains ou des pieds• D�c�s (5 � 15 % des cas m�me apr�s un traitement)

Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections   m ningocoque du s rotype B et leurs complications. Le vaccin est recommand  aux personnes qui ont un risque plus  lev  d'infection grave   m ningocoque.

Les sympt mes apr s la vaccination

Des sympt mes peuvent  tre caus s par le vaccin (ex. : rougeur   l'endroit o  l'injection a  t  faite). D'autres probl mes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de t te).

Le vaccin contre le m ningocoque de s rotype B est s curitaire. La majorit  des r actions sont b nignes et de courte dur e.

Fr�quence	R�actions connues caus�es par ce vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorit� des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none">• Douleur, rougeur et gonflement � l'endroit o� l'injection a �t� faite• Fi�vre (≥ 38 �C), pleurs inhabituels, perte d'app�tit, irritabilit�, somnolence (envie de dormir), vomissements et diarrh�e chez les enfants �g�s de moins de 2 ans	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une compresse humide froide � l'endroit o� l'injection a �t� faite.• Utiliser un m�dicament contre la fi�vre ou les malaises au besoin.• Consulter un m�decin selon la gravit� des sympt�mes.• Pour les enfants �g�s de moins de 2 ans, administrer de l'ac�taminoph�ne le plus t�t possible apr�s la vaccination, puis toutes les 4 � 6 heures pendant les 12 premi�res heures.
Tr�s souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none">• Mal de t�te chez les adolescents �g�s de 11 � 18 ans	

Il est recommand  de demeurer sur place au moins 15 minutes apr s une vaccination, car les r actions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une r action allergique survient, les sympt mes appara tront quelques minutes apr s la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette r action imm diatement sur place.

Pour toute question, consultez Info-Sant  811 ou votre m decin.