

# Immunoglobulines contre le tétanos (Tlg)

La vaccination,  
la meilleure protection

Avril 2018

Les Tlg sont des anticorps obtenus à partir du sang de plusieurs donneurs. Elles protègent contre le tétanos et ses complications. Le tétanos est une maladie causée par une bactérie. Il existe aussi un vaccin contre le tétanos, qui peut être donné en même temps que les Tlg. Les Tlg protègent pendant quelques mois, alors que le vaccin protège pour de nombreuses années.

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Tétanos</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>Le tétanos se transmet par une blessure, même petite, salie par de la terre, de la salive, de la poussière ou des selles d'humain ou d'animal.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Spasmes musculaires de la mâchoire</li><li>Spasmes des cordes vocales</li><li>Spasmes musculaires de tout le corps</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Problèmes respiratoires et cardiaques</li><li>Décès (10 à 80 % des cas)</li></ul>

## Les Tlg

Les Tlg sont un des moyens de protection contre le tétanos et ses complications. Les Tlg sont recommandées à certaines personnes qui ont possiblement été exposées à la bactérie du tétanos.

## Les symptômes après l'immunisation

Des symptômes peuvent être causés par les Tlg (ex. : douleur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec les Tlg (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Les Tlg sont sécuritaires. Dans la majorité des cas, elles ne provoquent aucune réaction.

Réactions possibles aux Tlg	Ce qu'il faut faire
<ul style="list-style-type: none"><li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>Fièvre légère</li><li>Problème aux reins (rares cas rapportés)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li><li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les maux de tête au besoin.</li><li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une immunisation avec des Tlg, car les réactions allergiques sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après l'immunisation. La personne qui donne les Tlg sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne les Tlg, ou consultez Info-Santé 8-1-1 ou votre médecin.**