

# Vaccin contre l'hépatite A

La vaccination,  
la meilleure protection

Juin 2023

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l'hépatite A et ses complications. L'hépatite A est une infection du foie causée par un virus (le virus de l'hépatite A).

Maladie	Transmission	Signes et symptômes	Complications possibles
<b>Hépatite A</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>L'hépatite A se transmet par un contact avec de l'eau ou des aliments contaminés par les selles d'une personne infectée.</li></ul> <p><i>Souvent, les jeunes enfants infectés n'ont pas de symptômes, mais ils peuvent transmettre l'hépatite A à leur entourage.</i></p>	<ul style="list-style-type: none"><li>Fièvre</li><li>Fatigue</li><li>Perte d'appétit</li><li>Jaunisse</li><li>Mal de tête</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Atteinte grave du foie</li><li>Fatigue durant plusieurs semaines</li><li>Décès (0,1 à 0,3 % des cas et jusqu'à 12 % chez les 60 ans et plus hospitalisés)</li></ul>

## Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre l'hépatite A et ses complications. Le vaccin est indiqué pour toute personne qui désire réduire son risque d'attraper l'hépatite A. Plusieurs doses du vaccin peuvent être nécessaires pour avoir la meilleure protection possible. Pour les enfants nés avant le 1<sup>er</sup> juin 2019, ce vaccin est administré en 4<sup>e</sup> année du primaire.

## Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin (ex. : rougeur à l'endroit où l'injection a été faite).

D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin contre l'hépatite A est sécuritaire. La majorité des réactions sont bénignes et de courte durée.

Fréquence	Réactions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorité des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>Douleur à l'endroit où l'injection a été faite</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.</li><li>Utiliser un médicament contre la fièvre ou les maux de tête au besoin.</li><li>Consulter un médecin selon la gravité des symptômes.</li></ul>
Très souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>Rougeur, gonflement à l'endroit où l'injection a été faite</li><li>Mal de tête, douleur musculaire, fatigue</li><li>Irritabilité chez les enfants âgés de 12 à 23 mois</li></ul>	
Souvent (moins de 10 % des gens)	<ul style="list-style-type: none"><li>Rougeurs sur la peau chez les enfants âgés de 12 à 23 mois</li><li>Fièvre, troubles gastro-intestinaux, symptômes respiratoires</li></ul>	

Note : Les réactions à l'endroit où l'injection a été faite sont moins fréquentes chez les enfants.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

**Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 811 ou votre médecin.**