

Vaccin conjugué contre le méningocoque de séro groupe C

La vaccination,
la meilleure protection

Juin 2023

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque de séro groupe C et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont 2 infections graves causées par le méningocoque de séro groupe C. Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque entre autres les sérogroupes A, B, C, W et Y. Ce vaccin protège contre le séro groupe C.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Méningocoque de séro groupe C	<ul style="list-style-type: none">• Forte fièvre• Mal de tête important• Nausées et vomissements• Atteinte de l'état général• Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau	<ul style="list-style-type: none">• Surdit�• Cicatrices• Dommages permanents au cerveau• Amputation des mains ou des pieds• D�c�s (5 � 15 % des cas m�me apr�s un traitement)

Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections   m ningocoque de s ro groupe C et leurs complications. En g n ral, ce vaccin est administr    l' ge de 18 mois.

Les sympt mes apr s la vaccination

Des sympt mes peuvent  tre caus s par le vaccin (ex. : rougeur   l'endroit o  l'injection a  t  faite).

D'autres probl mes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de t te).

Le vaccin conjugu  contre le m ningocoque de s ro groupe C est s curitaire. La majorit  des r actions sont b nignes et de courte dur e.

Fr�quence	R�actions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorit� des cas (plus de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none">• Douleur � l'endroit o� l'injection a �t� faite	<ul style="list-style-type: none">• Appliquer une compresse humide froide � l'endroit o� l'injection a �t� faite.• Utiliser un m�dicament contre la fi�vre ou les malaises au besoin.• Consulter un m�decin selon la gravit� des sympt�mes.
Tr�s souvent (moins de 50 % des gens)	<ul style="list-style-type: none">• Rougeur et gonflement � l'endroit o� l'injection a �t� faite• Fi�vre, somnolence (envie de dormir) et irritabilit�, surtout chez les enfants �g�s de moins de 5 ans• Mal de t�te, malaise, douleur musculaire et douleur aux jointures, surtout chez les personnes �g�es de 11 ans et plus• Perte d'app�tit, naus�es, vomissements, diarrh�e	

Il est recommand  de demeurer sur place au moins 15 minutes apr s une vaccination, car les r actions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une r action allergique survient, les sympt mes appara tront quelques minutes apr s la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette r action imm diatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous   la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Sant  811 ou votre m decin.