

Vaccin contre le chikungunya

La vaccination,
la meilleure protection

Novembre 2024

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre le chikungunya et ses complications. Ce vaccin est indiqué pour les voyageurs âgés de 18 ans et plus qui se rendent dans un pays où il existe un risque de transmission du virus du chikungunya.

| Maladie | Transmission | Signes et symptômes | Complications possibles |
|--------------------|--|---|--|
| Chikungunya | <ul style="list-style-type: none">Le virus du chikungunya se transmet habituellement par la piqûre d'un moustique infecté.Il peut se transmettre par transfusion sanguine, transplantation de tissus ou d'organe, et d'une personne enceinte à son fœtus. | <ul style="list-style-type: none">FièvreAtteinte de l'état généralMal de têteDouleurs musculairesDouleur aux articulationsRougeurs sur la peauNausées, vomissements et diarrhée | <ul style="list-style-type: none">Persistance de douleurs aux articulations pendant des mois ou des années (1 personne sur 3).Inflammation des enveloppes du cerveau (méningite) ou du cœur (péricardite), ainsi que du foie (hépatite) peut survenir, mais rarement. |

Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre le chikungunya et ses complications.

Les symptômes après la vaccination

Des symptômes peuvent être causés par le vaccin. D'autres problèmes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de tête).

Le vaccin contre le chikungunya est sécuritaire. Dans la majorité des cas, il ne provoque aucune réaction.

| Fréquence | Réactions connues au vaccin | Ce qu'il faut faire |
|--|---|---|
| Très souvent (moins de 50 % des gens) | <ul style="list-style-type: none">Mal de têteFatigueDouleurs musculairesDouleur aux articulationsFièvre | <ul style="list-style-type: none">Appliquer une compresse humide froide à l'endroit où l'injection a été faite.Utiliser un médicament contre la fièvre ou les malaises au besoin.Consulter un professionnel de la santé selon la gravité des symptômes. |
| Souvent (moins de 10 % des gens) | <ul style="list-style-type: none">Douleur à l'endroit où l'injection a été faiteNauséesRougeurs sur la peau | |
| Parfois (moins de 1 % des gens) | <ul style="list-style-type: none">Vomissements | |

Environ 12 % des gens vaccinés ont présenté des réactions indésirables semblables au chikungunya (fièvre ≥ 38 °C et l'une des réactions mentionnées dans le tableau précédent, ou un gonflement des ganglions, ou encore certains symptômes neurologiques, cardiaques, oculaires). 1,6 % des personnes vaccinées ont nécessité des soins médicaux ou une hospitalisation.

Il est recommandé de demeurer sur place au moins 15 minutes après une vaccination, car les réactions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une réaction allergique survient, les symptômes apparaîtront quelques minutes après la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette réaction immédiatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous à la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Santé 811 ou un professionnel de la santé.