

Vaccin conjugué quadrivalent contre le méningocoque

La vaccination,
la meilleure protection

Juin 2026

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections à méningocoque et leurs complications. La méningite (infection des enveloppes du cerveau) et la méningococcémie (infection du sang) sont deux infections graves causées par le méningocoque. Il existe différents sérogroupes (ou types) de méningocoque, entre autres les sérogroupes A, B, C, W et Y. Ce vaccin protège contre les sérogroupes A, C, W et Y.

Maladie	Signes et symptômes	Complications possibles
Infections à méningocoque	• Forte fièvre • Mal de tête important • Nausées et vomissements • Atteinte de l'état général • Rougeurs ou petites hémorragies de la taille d'une tête d'épingle ou bleus sur la peau	• Surdit� • Cicatrices • Dommages permanents au cerveau • Amputation des mains ou des pieds • D�c�s (5 � 15 % des cas m�me apr�s un traitement)

Le vaccin

La vaccination est le meilleur moyen de protection contre les infections   m ningocoque des s rogroupes A, C, W, Y et leurs complications. En g n ral, ce vaccin est administr    l' ge de 18 mois et en 3  ann e du secondaire. Le vaccin est aussi recommand  aux personnes qui ont un risque plus  lev  d'infection grave   m ningocoque. Il est aussi recommand  aux voyageurs qui se rendent dans des r gions o  le risque d'infection   m ningocoque est  lev .

Les sympt mes apr s la vaccination

Des sympt mes peuvent  tre caus s par le vaccin (ex. : rougeur   l'endroit o  l'injection a  t  faite).

D'autres probl mes peuvent arriver par hasard et n'ont aucun lien avec le vaccin (ex. : rhume, gastro, mal de t te).

Le vaccin conjugu  quadrivalent contre le m ningocoque est s curitaire. La majorit  des r actions sont b nignes et de courte dur e.

Fr�quence	R�actions possibles au vaccin	Ce qu'il faut faire
Dans la majorit� des cas (plus de 50 % des gens)	• Douleur � l'endroit o� l'injection a �t� faite	• Appliquer une compresse humide froide � l'endroit o� l'injection a �t� faite. • Utiliser un m�dicament contre la fi�vre ou les malaises au besoin. • Consulter un professionnel de la sant� selon la gravit� des sympt�mes.
Tr�s souvent (moins de 50 % des gens)	• Rougeur et gonflement � l'endroit o� l'injection a �t� faite • Mal de t�te, douleur musculaire, fatigue, malaise, naus�es, douleur aux jointures, diarrh�e, perte d'app�tit, irritabilit�, somnolence (envie de dormir)	
Souvent (moins de 10 % des gens)	• Fi�vre, frissons, vomissements, rougeurs sur la peau	

Il est recommand  de demeurer sur place au moins 15 minutes apr s une vaccination, car les r actions allergiques au vaccin sont toujours possibles. Si une r action allergique survient, les sympt mes appara tront quelques minutes apr s la vaccination. La personne qui donne le vaccin sera en mesure de traiter cette r action imm diatement sur place.

Pour toute question, adressez-vous   la personne qui donne le vaccin, ou consultez Info-Sant  811 ou un professionnel de la sant .